herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii es una rana dardo venenosa muy pequeña y diurna, de 13-16 mm, procedente de la cuenca del Amazonas. Es negra con rayas de rojas a anaranjadas, flancos amarillos y patas azules, y es poco frecuente en el hobby. Su mantenimiento se basa en la experiencia con el género, y la especie es adecuada para un cuidador con experiencia, paciencia y un suministro estable de presas diminutas.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates uakarii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-16 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-6 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**2-7**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-100 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un trío de *Ranitomeya uakarii* necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 45 cm. La medida está tomada del género. Si utilizas animales jóvenes, lo más seguro es empezar con al menos cuatro, para que haya ambos sexos.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-25 °C de día y a 18-21 °C de noche. Las cifras están tomadas del género. Rara vez se necesita calor adicional en una sala calefactada.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse en el 70-100 %. Pulveriza a diario, de modo que la humedad ronde el 100 % por la mañana y por la noche y el 70-75 % a mediodía. Así el terrario se seca un poco entre pulverizaciones.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un cuenco de agua poco profundo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Ranitomeya uakarii* es diurna, y la luz sirve sobre todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día con tubos fluorescentes o LED y oscuridad por la noche. No está documentado que la especie necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	La base de la dieta son pequeños artrópodos: moscas de la fruta ápteras, colémbolos, pequeñas cochinillas blancas y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ranitomeya uakarii* es diurna.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil, Colombia y Perú.