herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii es una rana venenosa pequeña y diurna, de 17-19 mm, procedente de la Amazonia occidental. Vive en los árboles y cría a sus renacuajos en el agua que se acumula en las bromelias. La hembra alimenta a los renacuajos con huevos no fecundados.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates vanzolinii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-19 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-6 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**1-6**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo y huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**23-26 °C**
Temperatura, noche	**19-23 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *Ranitomeya vanzolinii* necesita un terrario de al menos 40 × 40 × 40 cm, mejor de 50 × 50 × 50 cm.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe estar entre 23-26 °C, y por la noche se reduce 3-4 °C, hasta 19-23 °C. La variación a lo largo del año debe ser pequeña, de 1-2 °C. No hace falta un punto de calor y la especie no hiberna.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 70-100 %. Por la mañana y por la tarde debe estar cerca del 100 %, y al mediodía puede bajar hasta el 70-75 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua no es necesario para los adultos, pero es una ventaja, y puede ser poco profundo, con 1-2 cm de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	Las necesidades de luz de *Ranitomeya vanzolinii* son modestas. La rana necesita luz suficiente para ver su alimento, y las plantas necesitan más.
ALIMENTACIÓN	*Ranitomeya vanzolinii* se alimenta de pequeños artrópodos vivos: moscas de la fruta, colémbolos, pequeños isópodos tropicales y grillos recién nacidos. Los animales pequeños necesitan presas pequeñas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ranitomeya vanzolinii* es diurna, pero tímida. En un terrario con vegetación densa y muchos escondites se deja ver con más frecuencia que en uno con poca decoración.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil y Perú.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/ranitomeya-vanzolinii