herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Rana venenosa variable

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis es una rana venenosa pequeña y diurna, de 15-20 mm, procedente de las laderas orientales de los Andes y de la Amazonia. Presenta muchas formas locales en amarillo, verde y azul con dibujo negro, se reproduce en bromelias y es conocida porque el macho transporta los renacuajos entre las acumulaciones de agua de la planta. Es una buena primera especie entre las pequeñas ranas venenosas.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Variable Poison Frog Nombre anterior: *Dendrobates variabilis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**1-10**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo y otros renacuajos**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *R. variabilis* necesita un terrario de al menos 40 × 40 × 40 cm, y las mismas medidas bastan para un trío. Cada rana adicional necesita unos 4 litros más de espacio.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C de día y a 18-22 °C de noche. Durante breves periodos la especie tolera hasta 27 °C, pero la temperatura nunca debe superar los 29 °C. Los huevos y los renacuajos pueden mantenerse a 24 °C constantes.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 70-100 %. Procura alcanzar casi el 100 % por la mañana y por la noche y un 70-75 % a mediodía.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Ofrece a las ranas un recipiente de agua poco profundo o una pequeña zona de agua, y mantén el nivel tan bajo que la rana más pequeña pueda sentarse con la cabeza y la parte superior del cuerpo fuera del agua; la especie nada mal.
ILUMINACIÓN Y UVB	Las ranas son diurnas y viven en la sombra del bosque. La luz es sobre todo para las plantas: resulta adecuada una iluminación LED de 12-14 horas al día. No está documentado que la especie necesite UVB y normalmente no se usa.
ALIMENTACIÓN	*R. variabilis* es tan pequeña que solo puede comer presas pequeñas: colémbolos, moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*) y cochinillas de la humedad pequeñas. Los adultos grandes también pueden comer *D. hydei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. variabilis* es diurna y pacífica. Los machos cantan desde lugares elevados y, en la naturaleza, la especie tiene un sistema de apareamiento libre, sin parejas fijas ni territorios defendidos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Guayana Francesa.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/ranitomeya-variabilis