herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata es una rana venenosa pequeña, de hábitos diurnos y de menos de 18 mm, procedente de la selva del este de Ecuador, el noreste de Perú y el sureste de Colombia. En sentido estricto es negra, con finas rayas de color rosa y un patrón reticulado gris azulado en las patas y el vientre. Durante décadas el nombre ha abarcado otras especies en el hobby, por lo que es importante saber qué animales son en realidad.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-17 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-4**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo y otros renacuajos**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	La especie en sentido estricto es casi desconocida en los terrarios y no existe experiencia de mantenimiento referida exactamente a ella. Los valores indicados aquí son los mismos que para las demás Ranitomeya pequeñas.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C de día y a 18-22 °C de noche. La temperatura no debe superar nunca los 29 °C, y los terrarios pequeños se calientan enseguida en verano.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 70-100 %: cerca del 100 % por la mañana y por la noche y del 70-75 % a mediodía.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Ofrece a las ranas un recipiente de agua poco profundo o una pequeña zona de agua con 1-2 cm de agua, de modo que la rana más pequeña pueda estar con la cabeza y la parte superior del cuerpo fuera del agua; las ranas venenosas pequeñas nadan mal.
ILUMINACIÓN Y UVB	Las ranas son diurnas y viven a la sombra del bosque. La luz es ante todo para las plantas: lo habitual son 12-14 horas al día con luz LED.
ALIMENTACIÓN	*Ranitomeya ventrimaculata* es tan pequeña que solo puede comer presas pequeñas: colémbolos, moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), cochinillas tropicales pequeñas y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ranitomeya ventrimaculata* es diurna y vive sobre todo en la hojarasca del suelo del bosque. Los machos llaman con un zumbido rápido.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador, Perú y Colombia.