herpy

RANAS

Gliding Leaf Frog

Agalychnis spurrelli

Agalychnis spurrelli es una rana arborícola de 5-9 cm que habita en los bosques húmedos de tierras bajas de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador: verde en el dorso con manchas blancas, flancos naranjas y un iris rojo oscuro. Es nocturna, vive en lo alto de los árboles y puede planear de una rama a otra gracias a sus grandes membranas interdigitales. En el terrario es resistente y se reproduce con facilidad si se mantiene limpio y se deja secar durante el día.

Familia: Phyllomedusidae Nombre anterior: *Agalychnis litodryas*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**5-9 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**22-27 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**65-75 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 2-3 cm
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En hojas sobre el agua**
Madurez sexual	**12-18 meses**
Huevos por puesta	**30-110**
Eclosión	**7-9 días** a 24-26 °C
Periodo larvario	**42-63 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Agalychnis spurrelli* vive en lo alto de la vegetación, así que la altura del terrario y el número de ramas importan más que la superficie del suelo.
TEMPERATURA	De día el terrario se mantiene a 22-27 °C, y por la noche la temperatura puede bajar 3-5 °C, hasta 20-23 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental se mantiene en 65-75 % fuera de la época de cría.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	En el terrario debe haber siempre un recipiente grande y poco profundo con agua limpia, al que las ranas puedan subir y bajar con facilidad. La profundidad del agua es de 2-3 cm.
ILUMINACIÓN Y UVB	El terrario debe tener 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Una iluminación para plantas con LED o tubos fluorescentes da a las plantas lo que necesitan y a los animales un día bien marcado.
ALIMENTACIÓN	*Agalychnis spurrelli* come insectos vivos. Los grillos domésticos de tamaño adecuado son el alimento base, complementado con, por ejemplo, cucarachas, larvas de polilla de la cera y moscas domésticas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Agalychnis spurrelli* es tranquila y nocturna. Los machos no son agresivos entre sí fuera de la época de cría, y se pueden alojar juntos varios machos y ambos sexos mientras haya espacio suficiente.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.