herpy

RANAS

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima es la especie más grande del género: una rana robusta, de color pardo grisáceo y con la piel muy verrugosa, de 6-8 cm, con el vientre naranja marmoleado de negro, que muestra cuando se siente amenazada. Procede de las montañas del suroeste de China y necesita agua limpia y fresca y un terrario fresco. Es fácil de mantener si se mantiene baja la temperatura, pero es más exigente con la calidad del agua que *Bombina orientalis*.

Familia: Bombinatoridae Nombre anterior: *Bombinator maximus* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-8 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**6-15 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Semiacuático**
Hábitat	**Humedal y bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**18-23 °C**
Temperatura, noche	**12-17 °C**
Humedad	**60-85 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 5-10 cm
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**4-8 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Huevos por puesta	**20-150**
Eclosión	**3-10 días** a 18-22 °C
Periodo larvario	**30-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	La especie necesita un acuaterrario en el que aproximadamente dos tercios de la superficie del fondo sean agua y un tercio tierra. Cuatro adultos necesitan como mínimo 80 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	La especie procede de tierras altas frescas y debe mantenerse más fresca que la mayoría de las ranas. De día son adecuados 18-23 °C, y la temperatura nunca debería superar los 25 °C. De noche puede bajar a 12-17 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse en el 60-85 %. La gran parte acuática hace la mayor parte del trabajo, así que basta con pulverizar ligeramente la parte terrestre una vez al día.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	El agua debe tener 5-10 cm de profundidad y los animales deben poder salir siempre con facilidad, por ejemplo por raíces inclinadas, piedras planas o plantas.
ILUMINACIÓN Y UVB	Da 12 horas de luz al día en la mitad cálida del año y días algo más cortos en invierno, controlados con un temporizador. Una luminaria LED de espectro luz diurna aporta luz suficiente para las plantas.
ALIMENTACIÓN	El alimento debe moverse. Ofrece insectos de alimentación habituales de tamaño adecuado: grillos, moscas, cochinillas de la humedad, lombrices de tierra y caracoles pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es activa de día y al atardecer, y a menudo se ve a la vista, en tierra o flotando en la superficie. Se mantiene mejor en grupo. En la época de cría el ambiente se anima cuando los machos cantan desde el agua.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China.