herpy

RANAS

Climbing Mantella

Mantella laevigata

Mantella laevigata es una rana pequeña y diurna de los bosques lluviosos del noreste de Madagascar, y la única del género que trepa. Es negra, con el dorso de amarillo a verde claro y manchas azules en las extremidades; mide 2-3 cm y se reproduce en cañas de bambú y huecos de árboles llenos de agua, donde la hembra alimenta al renacuajo con huevos sin fertilizar. Necesita un terrario alto, húmedo y cálido, con muchas ramas.

Familia: Mantellidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**2-3 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**1,2-2 g**
Esperanza de vida	**4-8 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 50 × 100 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**20-26 °C**
Temperatura, noche	**17-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**1-3**
Eclosión	**2-7 días**
Periodo larvario	**90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas, huevos no fecundados de la hembra y otros renacuajos**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y alimenta a los renacuajos con huevos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Mantella laevigata* trepa, así que el terrario debe ser alto y estar organizado en vertical. La medida mínima para un grupo de cuatro adultos es 60 × 50 × 100 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 20-26 °C, y por la noche la temperatura baja 2-4 grados, hasta 17-22 °C. La temperatura diurna puede llegar a 27 °C, y durante periodos cortos la especie tolera hasta 30 °C y hasta 17-18 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 80-100 %. Pulveriza el terrario cada día con agua declorada o de lluvia, sobre todo en el periodo en que la especie debe reproducirse. El sustrato debe estar húmedo, pero nunca encharcado.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Coloca en el terrario uno o varios recipientes de agua poco profundos y mantenlos siempre llenos. La profundidad es de 1-2 cm, para que los animales puedan salir con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz debe adecuarse a las plantas, pero sin calentar el terrario. Ofrece 10-12 horas de día y oscuridad por la noche.
ALIMENTACIÓN	El alimento principal son artrópodos pequeños: colémbolos, moscas de la fruta, grillos recién nacidos, termitas y hormigas pequeñas. Los juveniles reciben colémbolos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos son relativamente atrevidos y cantan abiertamente para defender su territorio, mientras que las hembras son más retraídas. Los machos luchan por los territorios con forcejeos, persecuciones y saltos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Madagascar.