herpy

RANAS

Tonkin Bug-eyed Frog

Theloderma corticale

Theloderma corticale es una rana nocturna y semiacuática de los bosques del norte de Vietnam, Laos y el sur de China. Su piel nudosa, moteada en verde y negro, se parece tanto al musgo y al liquen que la rana casi desaparece en el terrario. Necesita frescor y humedad, no tolera el calor y, en cambio, es fácil de reproducir.

Familia: Rhacophoridae Nombre anterior: *Rhacophorus corticalis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-9 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y semiacuático**
Hábitat	**Selva tropical, bosque de montaña y terreno rocoso**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 50 × 40 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**18-23 °C**
Temperatura, noche	**15-20 °C**
Humedad	**80-90 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 5-10 cm
Temperatura del agua	**17-22 °C**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Reposo invernal	**13-16 °C** 4-22 semanas
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos en el agua**
Lugar de puesta	**En hojas sobre el agua**
Madurez sexual	**8-10 meses**
Huevos por puesta	**6-47**
Eclosión	**9-22 días**
Periodo larvario	**75-180 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Theloderma corticale* necesita un acuaterrario en el que gran parte del fondo, o todo, esté bajo el agua. Calcula como mínimo 80 × 50 × 40 cm (largo × ancho × alto) para un macho y de una a tres hembras, o unos 38 litros por rana.
TEMPERATURA	El calor es el mayor enemigo de la especie. De día debe haber 18-23 °C y de noche 15-20 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser alta: por encima del 80 % y nunca por debajo del 60 %, o las ranas pueden deshidratarse. Las hembras ponen huevos con un 80-90 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La parte acuática es el hogar de la especie. El agua debe tener 5-10 cm de profundidad, y también sirve más profunda. Las ranas deben poder permanecer en el agua y subir fácilmente al corcho o a las raíces.
ILUMINACIÓN Y UVB	La rana es nocturna y no tiene una necesidad documentada de UVB. Se puede usar un tubo UVB débil para especies de sombra (zona 1 de Ferguson), que aporta el pequeño índice UV capaz de apoyar el ritmo circadiano, pero es opcional.
ALIMENTACIÓN	*T. corticale* come insectos: grillos bien cargados de alimento, cucarachas dubia, larvas de polilla de la cera, larvas de mosca soldado negra y pequeños gusanos de seda.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Theloderma corticale* es tranquila y se esconde de día en tubos, cuevas y entre las plantas. Unos minutos después de apagar la luz se activa. No debe manipularse, porque la piel es sensible y la rana no gana nada con ello.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Vietnam, Laos y China.