herpy

RANAS

## Amazon Milk Frog

# *Trachycephalus resinifictrix*

*Trachycephalus resinifictrix* es una rana arborícola grande, robusta y nocturna del dosel del Amazonas. Los juveniles tienen bandas negras y blancas, los adultos son marmoleados y, cuando se siente amenazada, la rana segrega una secreción cutánea blanca como la leche. Se reproduce en huecos de árbol llenos de agua, es resistente y fácil de mantener, y se parece en muchos aspectos a *Ranoidea caerulea*.

Familia: Hylidae  Nombre anterior: *Phrynohyas resinifictrix*  **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **6-10 cm**<br>longitud hocico-cloaca |
| Esperanza de vida | **8-10 años** |
| Activo | **De noche** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Selva tropical** |
| Toxinas cutáneas | **Leves**<br>Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca |
| Dificultad | **Intermedio** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Renacuajos en el agua** |
| Lugar de puesta | **En el agua** |
| Madurez sexual | **12-18 meses** |
| Huevos por puesta | **100-1.500** |
| Eclosión | **1-2 días** |
| Periodo larvario | **21-75 días**<br>desde la eclosión hasta la metamorfosis |
| Alimentación de las larvas | **Alimento completo** |
| Cuidado parental | **Ninguno** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **75 × 30 × 45 cm**<br>L × An × Al para 2 adultos |
| Temperatura, día | **21-29 °C** |
| Temperatura, noche | **18-21 °C** |
| Humedad | **50-100 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentación | **Insectos y lombrices/caracoles** |
| Se mantiene | **En solitario, en pareja o en grupo** |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Una pareja adulta necesita un terrario de al menos 75 × 30 × 45 cm (largo × ancho × alto), que sirve para hasta cuatro adultos. Un grupo de cinco necesita al menos 60 × 45 × 60 cm. |
| **TEMPERATURA** | *Trachycephalus resinifictrix* tolera un amplio rango de temperaturas. |
| **HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN** | La humedad ambiental es menos crítica que la temperatura, pero el terrario debe pulverizarse al menos una vez al día. Usa agua del grifo declorada o agua de ósmosis, que además no deja manchas de cal en el cristal. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | *Trachycephalus resinifictrix* necesita un recipiente grande con agua limpia, equivalente al hueco de árbol de la naturaleza. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | *Trachycephalus resinifictrix* es nocturna y puede vivir y reproducirse sin UVB, pero los juveniles que crecen con UVB se hacen más grandes y desarrollan un esqueleto más sano que los que no lo reciben. |
| **ALIMENTACIÓN** | *T. resinifictrix* es voraz y rara vez exigente. Los grillos pueden constituir la mayor parte de la dieta y deben medir aproximadamente lo mismo que la anchura de la cabeza de la rana. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *T. resinifictrix* no es un animal para manipular. La piel es permeable y sensible a los aceites y sales de la piel humana, y la secreción cutánea puede irritar. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. |