herpy

RANAS

Milk Frog

# *Trachycephalus typhonius*

*Trachycephalus typhonius* es una rana arborícola grande y nocturna, de piel granulosa y con un borde dorado alrededor de los ojos. Vive en un área enorme que va desde Centroamérica hasta el norte de Argentina, desde la selva tropical hasta la sabana y los jardines. La piel segrega una sustancia blanca que irrita las mucosas, y la experiencia con su cuidado es escasa.

Familia: Hylidae  Nombre anterior: *Phrynohyas venulosa*  **Toxinas cutáneas leves**

## DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **6-8 cm**<br>longitud hocico-cloaca |
| Esperanza de vida | **8-10 años** |
| Activo | **De noche** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Sabana, bosque seco y selva tropical** |
| Toxinas cutáneas | **Leves**<br>Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca |
| Dificultad | **Intermedio** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Renacuajos en el agua** |
| Lugar de puesta | **En el agua** |
| Huevos por puesta | **100-1.500** |
| Eclosión | **1-2 días** |
| Periodo larvario | **21-75 días**<br>desde la eclosión hasta la metamorfosis |
| Alimentación de las larvas | **Algas/plantas y alimento completo** |
| Cuidado parental | **Ninguno** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **60 × 40 × 60 cm**<br>L × An × Al para 2 adultos |
| Temperatura, día | **24-28 °C** |
| Temperatura, noche | **18-22 °C** |
| Humedad | **60-90 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentación | **Insectos** |
| Se mantiene | **En solitario, en pareja o en grupo** |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

**EL TERRARIO**
El cuidado de *Trachycephalus typhonius* se basa en la especie muy emparentada *Trachycephalus resinifictrix*, una rana arborícola igualmente grande y nocturna.

**TEMPERATURA**
Mantén el terrario a 24-28 °C durante el día y a 18-22 °C por la noche. No hay descanso invernal. La rana tolera una desviación breve, pero la temperatura no debe superar los 30 °C durante mucho tiempo.

**HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN**
La humedad debe situarse en el 60-90 %, con un aumento tras la pulverización. La especie vive también en biotopos secos y es resistente, así que el aire no necesita estar saturado todo el tiempo.

**AGUA Y CALIDAD DEL AGUA**
Coloca en el terrario un recipiente de agua grande y estable. Debe ser lo bastante grande para que la rana quepa dentro, y el agua debe ser poco profunda para que el animal pueda salir con facilidad.

**ILUMINACIÓN Y UVB**
Ofrece 10-12 horas de luz al día, sobre todo por las plantas. La rana duerme de día y es más activa en la oscuridad, por lo que no necesita una luz intensa. Un nivel bajo de UVB ayuda a la rana a absorber el calcio del alimento.

**ALIMENTACIÓN**
La rana come casi todo lo que puede manejar: grillos, moscas domésticas, moscas de la carne, cucarachas, gusanos y otros insectos.

**COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN**
*Trachycephalus typhonius* es nocturna y duerme de día escondida, a menudo en lo alto, y se activa cuando se apaga la luz.

**ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL**
México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.