herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Spotted Salamander

Ambystoma maculatum

Ambystoma maculatum es una salamandra robusta de 15-25 cm de longitud, originaria de los bosques caducifolios de Norteamérica, de color negro o gris oscuro con dos hileras de grandes manchas de color amarillo a naranja a lo largo del dorso. Los adultos viven ocultos bajo hojas y madera y en galerías del suelo, y salen de noche, mientras que los huevos y las larvas se desarrollan en estanques forestales sin peces. La especie es tranquila y se encuentra mejor en un ambiente fresco.

Familia: Ambystomatidae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Principiante**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**24-84 meses**
Huevos por temporada	**100-370**
Eclosión	**28-49 días**
Periodo larvario	**60-120 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**14-20 °C**
Temperatura, noche	**10-16 °C**
Humedad	**80-95 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un adulto puede mantenerse en una superficie de 50 × 30 cm, y dos adultos en al menos 75 × 30 cm. La superficie del suelo es más importante que la altura, y con 30 cm de altura basta.
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 14-20 °C y por la noche 10-16 °C. La especie ama el frío y es más activa a 10-21 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El sustrato debe estar húmedo, pero nunca empapado ni embarrado, porque el animal absorbe agua a través de la piel y no bebe por la boca. Un sustrato húmedo proporciona una humedad del aire del 80-95 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua bajo y pesado es una buena medida de seguridad: si el sustrato se seca demasiado, el animal puede tumbarse en él.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y vive oculta bajo tierra, así que no necesita una iluminación especial ni UVB. La luz UV intensa puede dañar los ojos y la piel de los anfibios.
ALIMENTACIÓN	Los adultos comen lombrices de tierra, lombrices de compost, grillos, cucarachas y pequeños caracoles.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos permanecen ocultos la mayor parte del tiempo y salen de noche a cazar. La especie es tranquila y rara vez muerde.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Canadá y Estados Unidos.