herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium es una salamandra robusta, de hasta 30-35 cm de largo, procedente de las praderas, los bosques y los semidesiertos de Norteamérica, con bandas transversales y manchas amarillas sobre un fondo oscuro. Las larvas viven en el agua, mientras que los adultos pasan la mayor parte de la vida en galerías que excavan ellos mismos y salen por la noche. Algunos ejemplares nunca se metamorfosean y alcanzan la madurez sexual conservando las branquias.

Familia: Ambystomatidae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-30 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Principiante**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**5-36 meses**
Huevos por temporada	**100-1.000**
Eclosión	**19-50 días**
Periodo larvario	**75-150 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 25 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**18-22 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**80-95 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Los adultos pueden mantenerse en muchos tipos de recipientes.
TEMPERATURA	La temperatura debe estar entre 18 y 22 °C durante el día y, preferiblemente, algo más baja por la noche, tanto para las larvas como para los adultos. La especie tolera mejor el frío que el calor.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El sustrato debe estar húmedo, pero nunca empapado ni embarrado, porque el animal absorbe agua a través de la piel y no bebe con la boca.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un cuenco de agua bajo y pesado no es imprescindible, pero ofrece buena seguridad: si el sustrato se seca demasiado, el animal se mete en el cuenco, de modo que previene muertes por desecación.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y no necesita una iluminación especial. No se sabe que necesite UVB, y una luz UV intensa puede dañar los ojos y la piel de los anfibios.
ALIMENTACIÓN	Las larvas y los ejemplares neoténicos comen lombrices de tierra, lombrices de compost, grillos de tamaño adecuado, larvas de polilla de la cera y peces pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos excavan y permanecen ocultos la mayor parte del día. Son nocturnos y cazadores activos que esperan al acecho. Muchos animales llegan a reconocer a su cuidador y piden comida.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Canadá, Estados Unidos y México.