herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Eastern Tiger Salamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum es una salamandra robusta de la mitad oriental de Estados Unidos, que suele medir entre 15 y 20 cm y presenta manchas de color amarillo a verde oliva sobre un fondo marrón a negro. Las larvas viven en el agua, mientras que los adultos pasan la mayor parte de su vida en galerías que excavan ellos mismos y salen por la noche. Algunos ejemplares nunca se metamorfosean y alcanzan la madurez sexual conservando las branquias.

Familia: Ambystomatidae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-33 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**12-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 25 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**18-22 °C**
Temperatura, noche	**16-22 °C**
Humedad	**80-95 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**5-48 meses**
Huevos por temporada	**100-1.000**
Eclosión	**12-50 días**
Periodo larvario	**75-150 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Los adultos se pueden mantener en muchos tipos de recipientes.
TEMPERATURA	*Ambystoma tigrinum* necesita entre 18 y 22 °C durante el día, tanto de larva como de adulto, y por la noche la temperatura puede bajar hasta 16 °C. La especie tolera mejor el frío que el calor.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El sustrato debe estar húmedo, pero nunca empapado ni encharcado, porque el animal absorbe agua a través de la piel. La humedad ambiental no está documentada para la especie; el 80-95 % está tomado de *Ambystoma mavortium*.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Los adultos no necesitan una zona de agua: son malos nadadores y pueden ahogarse.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Ambystoma tigrinum* es nocturna y no necesita una iluminación especial. No hay datos de que la especie necesite UVB, y una luz UV intensa puede dañar los ojos y la piel de los anfibios.
ALIMENTACIÓN	Las larvas y los ejemplares neoténicos comen lombrices de tierra, lombrices de compost, grillos de tamaño adecuado, larvas de la polilla de la cera y peces pequeños (no peces de colores).
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos excavan y permanecen ocultos la mayor parte del día. Son nocturnos y cazan al acecho. Muchos ejemplares aprenden a reconocer a su cuidador y piden comida.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/salamandras/ambystoma-tigrinum