herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus es una salamandra cocodrilo oscura y verrugosa de 12-15 cm, con protuberancias costales nudosas y crestas dorsales marcadas. Vive en zonas montañosas húmedas de la provincia china de Guangxi y ha dado nombre a todo un grupo de salamandras cocodrilo muy emparentadas, que solo hace poco se han separado como especies independientes.

Familia: Salamandridae Nombre anterior: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-15 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**20-24 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 1-5 cm
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**8-12 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por temporada	**30-80**
Eclosión	**20-36 días** a 22-24 °C
Periodo larvario	**50-110 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Tylototriton asperrimus*.
TEMPERATURA	En verano el terrario se mantiene a 20-24 °C de día y 18-21 °C de noche, lo que corresponde al verano de la zona de distribución.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental es del 80-100 %. El terrario se pulveriza a diario con un pulverizador de flores, y debe haber zonas más húmedas y más secas para que el aire no se estanque.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La zona acuática debe tener agua blanda y ligeramente ácida; el agua de lluvia o de ósmosis es adecuada. El pH del agua no está documentado para *Tylototriton asperrimus*; *Tylototriton ziegleri* se mantiene a pH 6,4-6,8.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz no tiene especial importancia para los animales y se ajusta a las plantas: tiras LED o tubos fluorescentes durante 12 horas en verano y 10-11 horas en invierno. No se necesita UVB para esta especie de hábitos ocultos.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben lombrices de hojarasca, grillos, grillos domésticos, larvas de polilla de la cera, lombrices de tierra e isópodos de tamaño adecuado unas dos veces por semana. En invierno comen de forma irregular y mucho menos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	En las especies muy emparentadas, los animales viven muy ocultos y se ven sobre todo cuando se alimentan o cuando los machos están en el agua.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China.