herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis es una salamandra cocodrilo robusta, de color pardo negruzco, de 15-21 cm, con tres anchas franjas de naranja a rojizo a lo largo del cuerpo. Vive en tierra en las montañas de Guizhou y Yunnan y entra en el agua sobre todo para reproducirse. Se mantiene mejor en un terrario grande con zona terrestre y zona acuática.

Familia: Salamandridae Nombre anterior: *Pleurodeles kweichowensis* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-21 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y semiacuático**
Hábitat	**Bosque de montaña y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En hojas sobre el agua**
Huevos por temporada	**50-150**
Puestas por año	**1**
Eclosión	**10-12 días** a 25 °C
Periodo larvario	**80-100 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**18-25 °C**
Temperatura, noche	**15-20 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 10-15 cm
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Tylototriton kweichowensis* necesita un terrario grande, porque los animales son grandes y pesados, necesitan una zona terrestre firme con un escondite para cada ejemplar y requieren agua suficiente tanto para las larvas como para un filtro.
TEMPERATURA	La especie prospera a temperatura ambiente normal: 18-25 °C de día y 15-20 °C de noche. En verano el día puede situarse en la parte alta del intervalo, y en invierno se mantienen 15-20 °C durante todo el día.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser alta, pero el sustrato no debe estar mojado; 70-90 % es una estimación. La zona terrestre se mantiene húmeda sin llegar a embarrarse, y una parte del suelo puede estar más seca.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La zona acuática ocupa aproximadamente la mitad del terrario. La profundidad no está documentada para la especie; los 10-15 cm se han tomado prestados de *Tylototriton verrucosus*.
ILUMINACIÓN Y UVB	No hace falta UVB, y la especie es más activa al anochecer y por la noche.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben lombrices de tierra troceadas, grillos y otras presas de tamaño adecuado. Las larvas de la polilla de la cera y otras larvas grasas gustan mucho, pero no deben ser el alimento base.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es lenta y torpe. Se pueden mantener juntos 2-3 animales cuando hay suficientes escondites para cada uno.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China.