herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus es una salamandra cocodrilo grande, de color marrón oscuro, procedente de las montañas del oeste de Yunnan, del norte de Myanmar y de zonas colindantes. Mide 13-24 cm y es la más acuática de las salamandras cocodrilo que se mantienen en terrarios: en la época cálida del año suele permanecer por completo en el agua, donde se muestra activa y curiosa.

Familia: Salamandridae Nombre anterior: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-24 cm** longitud total con la cola
Peso	**12-18 g**
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Semiacuático**
Hábitat	**Bosque de montaña y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el agua**
Madurez sexual	**12-36 meses**
Huevos por temporada	**30-200**
Eclosión	**10-12 días** a 25 °C
Periodo larvario	**90-150 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 30 × 35 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**18-25 °C**
Temperatura, noche	**15-20 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 12-15 cm
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Tylototriton verrucosus* se mantiene mejor en un acuaterrario. Por encima de unos 18 °C, la forma oscura puede mantenerse totalmente en el agua.
TEMPERATURA	De día la temperatura debe ser de 18-25 °C, con unos 25 °C en verano, y de noche de 15-20 °C. En invierno los animales se mantienen a 15-18 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental no es decisiva en un montaje con mucha agua; 70-90 % es una estimación. Donde hay tierra, la parte terrestre se mantiene húmeda, pero no embarrada. Procura que el aire no esté estancado.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La profundidad del agua es de 12-15 cm. Cambia el 20-30 % del agua cada dos semanas, y con más frecuencia si hay muchos restos de comida.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es crepuscular y nocturna, y no es necesario UVB. Un fotoperiodo de unas 12 horas en verano es un buen ritmo, aunque no imprescindible, y la luz solo debe ser adecuada para las plantas. Evita el sol directo.
ALIMENTACIÓN	La especie no es exigente, y las hembras grandes pueden comer una cantidad asombrosa en poco tiempo.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	En el agua el animal es activo y curioso y puede llegar a ser bastante manso: nada hasta el cristal para pedir comida y la toma de pinzas y dedos. Sin embargo, no es apto para la manipulación diaria.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China, Myanmar (Birmania), India y Tailandia.