herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Vietnam Crocodile Newt

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis es un tritón cocodrilo pequeño y oscuro, de 12-17 cm, procedente de unos pocos restos de bosque del norte de Vietnam. El animal es de color negro a gris pardo, con dedos, pies y base de la cola de un amarillo intenso a rojo anaranjado, y vive sobre todo en tierra. La especie se describió por primera vez en 2005 y es vulnerable en la naturaleza.

Familia: Salamandridae **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-17 cm** longitud total con la cola
Peso	**7-18 g**
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**18 meses**
Huevos por temporada	**5-178**
Puestas por año	**1-2**
Eclosión	**28 días** a 22-24 °C
Periodo larvario	**60-180 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**23-25 °C**
Temperatura, noche	**23-25 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 1-5 cm
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Tylototriton vietnamensis* se mantiene en un terrario de selva tropical con una zona de agua.
TEMPERATURA	De marzo a octubre el terrario se mantiene a 23-25 °C las 24 horas; no hay documentada una temperatura nocturna distinta. Se toleran picos breves por encima de 30 °C, pero siempre debe haber zonas más frescas en el terrario.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad relativa es del 70-100 % en la parte cálida del año. El terrario se pulveriza a diario con un pulverizador de flores o un sistema de lluvia; la cantidad depende del tamaño y la ventilación del terrario.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La zona de agua tiene 1-5 cm de profundidad y ocupa una cuarta parte de la superficie de base. El agua es blanda y ligeramente ácida (pH 6,4-6,8), como en la naturaleza.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz no tiene una importancia especial para los animales, y no les gusta la luz intensa. La iluminación puede ajustarse a las plantas, con regletas LED o tubos fluorescentes, o simplemente con la luz que entra en la habitación.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben lombrices de tierra, grillos y larvas de polilla de la cera, y los propios insectos se alimentan con una dieta variada y se espolvorean con suplementos de vitaminas y minerales.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los animales buscan refugio y no les gusta la luz intensa. Los machos entran en el agua en la época de cría, se vuelven más claros y adquieren una piel claramente distinta, y esperan a las hembras.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Vietnam.