herpy

SALAMANDRAS Y TRITONES

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri es una pequeña salamandra cocodrilo, casi totalmente negra, de 13-16 cm, con tres filas de grandes verrugas a lo largo del dorso y dedos, patas y parte inferior de la cola de un rojo intenso. La especie fue descrita en 2013, vive oculta en bosques de montaña del norte de Vietnam y el sur de China y es fácil de mantener en un terrario con una pequeña zona de agua.

Familia: Salamandridae Nombre anterior: *Yaotriton ziegleri* **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-16 cm** longitud total con la cola
Peso	**6-16 g**
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**22-24 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 1-5 cm
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**16-18 °C** 12-17 semanas
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por temporada	**30-80**
Eclosión	**20-36 días** a 20-24 °C
Periodo larvario	**50-110 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Otros larvas y pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Tylototriton ziegleri* se mantiene en un terrario de selva tropical con una pequeña zona de agua. Para tres adultos se necesita un terrario de al menos 60 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	De marzo a octubre el terrario se mantiene a 22-24 °C durante el día y a 20-22 °C por la noche.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental es del 80-100 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La zona de agua debe tener agua blanda y ligeramente ácida con pH 6,4-6,8; por ejemplo, agua de lluvia que haya reposado un tiempo. El agua tiene como máximo 5 cm de profundidad. No uses nunca agua del grifo sin eliminar el cloro.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz no tiene especial importancia para los animales, a los que no les gusta la luz intensa. Se ajusta según las plantas: tiras LED o tubos fluorescentes durante 12 horas en verano y 10-11 horas en invierno.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben el alimento habitual para salamandras: gusanos de harina, grillos, grillos domésticos, larvas de polilla de la cera, lombrices de tierra e isópodos de tamaño adecuado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los animales son discretos y tranquilos y se ven sobre todo cuando se alimentan o cuando los machos están en el agua.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Vietnam y China.