herpy

SERPIENTES

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus es una serpiente constrictora pequeña, esbelta y nocturna de las sabanas de África occidental, donde suele vivir cerca de las casas de las personas y come de todo, desde lagartijas hasta roedores. Los ejemplares que se comercializan son resistentes y por lo general se vuelven tranquilos de adultos, pero tienen un reflejo de alimentación muy ansioso y son grandes artistas de la fuga.

Familia: Lamprophiidae Nombre anterior: *Lamprophis fuliginosus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**60-120 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-16 huevos**
Puestas por año	**1-4**
Incubación	**55-65 días** a 29-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto de *B. fuliginosus* necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 40 cm. Cuanto más grande, mejor, y las hembras grandes se sienten bien en 100 × 50 × 40 cm.

TEMPERATURA

El terrario debe tener un gradiente de temperatura claro. Durante el día hay 24-28 °C en el terrario, con alrededor de 24 °C en el lado frío.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe situarse en 40-60 %. En la mayoría de las viviendas se consigue con un recipiente de agua, y rara vez es necesario pulverizar.

ILUMINACIÓN Y UVB

B. fuliginosus es nocturna y no necesita luz intensa. Un ritmo fijo de unas 12 horas de luz y 12 de oscuridad durante todo el año da un ciclo diario claro.

ALIMENTACIÓN

Boaedon fuliginosus mata a sus presas por constricción, tiene un reflejo de alimentación fuerte y casi siempre come. Se alimenta con ratones o ratas pequeñas enteros y descongelados, nunca con presas vivas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Las crías y los subadultos pueden ser rápidos, propensos a morder e inquietos, y pueden saltar fuera del terrario como un resorte cuando se abre la tapa. Por eso abre la tapa con cuidado sobre un lugar seguro.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benín, Níger, Nigeria, Camerún, Chad y República Centroafricana.