herpy

SERPIENTES

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki es una culebra real de tamaño mediano a grande del centro y el sur de Estados Unidos, de color negro con una pequeña mancha blanco amarillenta en casi todas las escamas, de modo que el dibujo recuerda a la sal y la pimienta. Alcanza 90-120 cm, se alimenta de roedores, lagartos, ranas y otras serpientes, y es robusta y fácil de mantener. Se mantiene sola en un terrario de suelo con zona de calor y humedad moderada, y puede vivir más de 20 años.

Familia: Colubridae Nombre anterior: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**90-120 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Humedal y bosque y prado templados**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**21-28 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-15 huevos**
Incubación	**60-70 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento específico de *Lampropeltis holbrooki*.
TEMPERATURA	El animal regula su temperatura desplazándose entre zonas cálidas y frías, así que el terrario debe tener un gradiente claro.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe situarse en el 40-60 %, medida con un higrómetro digital en el centro del terrario. Es más alta en el extremo frío y por la noche, y más baja en el extremo cálido, y eso es normal.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol en la naturaleza. Puede pasar sin UVB, pero se recomienda UVB para un mejor bienestar. Corresponde a la zona 2 de Ferguson.
ALIMENTACIÓN	*L. holbrooki* es carnívora y necesita presas enteras. Los ratones son el alimento estándar y, cuando el animal crece, se usan ratas jóvenes.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*L. holbrooki* es robusta y tolerante. Deja a un animal nuevo unas 2 semanas en paz y empieza a manipularlo solo cuando coma con regularidad.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos.