herpy

SERPIENTES

## Eastern Pinesnake

# *Pituophis melanoleucus*

*Pituophis melanoleucus* es una serpiente robusta, diurna y excavadora del sureste de Estados Unidos, donde vive en pinares arenosos y matorral abierto. Mide 120-210 cm, es de color claro con manchas oscuras y tiene un hocico puntiagudo adaptado para excavar. Cuando se siente amenazada, sisea con fuerza y hace vibrar la cola como una serpiente de cascabel. Es resistente y come con facilidad, pero es grande, fuerte y una escapista muy hábil.

Familia: Colubridae  Nombre anterior: *Coluber melanoleucus; Pityophis melanoleucus*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **120-210 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **10-20 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Terrestre y excavador** |
| Hábitat | **Sabana y bosque y prado templados** |
| Dificultad | **Intermedio** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **120 × 60 × 45 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **24-29 °C** |
| Punto caliente | **30-34 °C** |
| Temperatura, noche | **18-24 °C** |
| Humedad | **30-50 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **No necesario** |
| Alimentación | **Vertebrados** |
| Se mantiene | **En solitario** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Madurez sexual | **36-48 meses** |
| Tamaño de la puesta | **3-24 huevos** |
| Puestas por año | **1** |
| Incubación | **64-79 días**<br>a 26-28 °C |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Se dispone de relativamente poca información sobre el cuidado de *Pituophis melanoleucus*, porque los animales del comercio suelen venderse con otros nombres. |
| **TEMPERATURA** | De día, el terrario debe mantenerse a 24-29 °C, con una zona caliente de 30-34 °C bajo la fuente de calor y un extremo fresco de hasta 24 °C, para que la serpiente pueda elegir, sobre todo después de comer. |
| **HUMEDAD Y AGUA** | La humedad ambiental debe situarse en el 30-50 %. *Pituophis melanoleucus* procede de hábitats secos y arenosos, y el sustrato debe mantenerse seco. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | *Pituophis melanoleucus* es diurna, pero rara vez toma el sol y no necesita luz UVB para mantenerse sana. Basta con un ritmo normal de día y noche, de unas 12 horas de luz y 12 de oscuridad, controlado con un temporizador. |
| **ALIMENTACIÓN** | *Pituophis melanoleucus* se alimenta de roedores, y en cautividad se le dan ratones y ratas congelados y descongelados. Los pollitos y las codornices pueden aportar variedad. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *Pituophis melanoleucus* tiene una defensa dramática. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Estados Unidos. |