herpy

SERPIENTES

Sumatran Short-tailed Python

Python curtus

Python curtus es una pitón pesada y de cola corta de los bosques pantanosos y selvas de Sumatra, de color marrón oscuro a negro carbón, a menudo con la cabeza gris o plateada. Mide 110-150 cm, pesa varios kilos y come ratas. Vive 20-25 años y se mantiene en un terrario grande y ventilado, de suelo amplio, con calor estable, una humedad del 60-80 % y un recipiente de agua grande.

Familia: Pythonidae Nombre anterior: *Aspidoboa curta*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**110-150 cm** longitud total con la cola
Peso	**4.000-7.000 g**
Esperanza de vida	**20-25 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-28 °C**
Punto caliente	**30-31 °C**
Temperatura, noche	**25-26 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36-48 meses**
Tamaño de la puesta	**6-12 huevos**
Incubación	**75-90 días** a 31-32 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Python curtus es una pitón robusta, de constitución pesada y con una cola muy corta en proporción al cuerpo. Los adultos son de color marrón oscuro a negro carbón, con la cabeza negra, gris o plateada; algunos ejemplares tienen la cabeza naranja o amarilla. La especie no tiene variedades de color rojas ni naranjas; esas solo las tiene *P. brongersmai*. Las crías son más claras que los adultos y se oscurecen mucho al crecer. El nombre de la especie, *curtus*, significa «corto» en latín.

Los adultos miden 110-150 cm incluida la cola, y algunos ejemplares viejos pueden acercarse a los 2 m. Las hembras son claramente más grandes y pesadas que los machos. Un adulto de 120-150 cm pesa normalmente 4-7 kg, mucho más que muchas serpientes más largas, porque el cuerpo es muy robusto. Las crías recién nacidas miden 20-30 cm. Es la más pequeña de las tres pitones de cola corta. Las otras dos, *P. brongersmai* y *P. breitensteini*, se consideraron antes subespecies de *P. curtus*, pero desde 2001 son especies propias con sus propias guías. En el comercio, las tres se mezclan a menudo bajo nombres comerciales comunes, así que pregunta siempre por el nombre científico y por el origen del animal.

La especie es muy ruidosa: cuando se siente amenazada, sisea y resopla con fuerza y puede morder, pero los ejemplares criados en cautividad suelen ser tranquilos una vez acostumbrados al manejo. La mala fama que adquirió el grupo con los adultos capturados en la naturaleza que se importaban antes no se corresponde con los animales de cría actuales. Es una especie más adecuada para cuidadores con experiencia en humedad tropical y en pitones pesadas. La esperanza de vida es de 20-25 años.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación Leer más: Comprar animales: cría en cautividad, captura silvestre y transporte

Distribución y hábitat

Python curtus vive en Sumatra, en Indonesia, en las zonas sur y oeste de la isla, y en las islas cercanas de Bangka y Siberut. La localidad tipo es Sumatra. La especie no se encuentra en Tailandia, y las citas de Singapur probablemente corresponden a *Malayopython reticulatus*.

P. brongersmai vive en el este y el norte de Sumatra y en la península malaya, y *P. breitensteini* en Borneo. Los animales que se ven en el comercio proceden sobre todo de Indonesia: muchos han eclosionado en cautividad a partir de hembras gestantes capturadas en la naturaleza y luego se han exportado, mientras que otros se han criado durante varias generaciones.

> **Área de distribución natural:** Indonesia.

HÁBITAT

Python curtus vive en bosques tropicales de tierras bajas, bosques pantanosos y ciénagas, y a lo largo de orillas de ríos y arroyos. Es terrestre y muy sedentaria: permanece enrollada en un escondite o semienterrada entre tierra y hojas, al acecho de roedores y aves a lo largo de senderos estrechos cerca del agua. Es más activa al atardecer y por la noche, cuando sale para beber, meterse en el agua y cazar.

El clima es cálido y húmedo todo el año, con poca diferencia entre estaciones. El suelo es húmedo y está formado por gruesas capas de material vegetal. La especie bebe mucho y le gusta permanecer en el agua. Eso explica sus exigencias de humedad alta, calor estable y un recipiente de agua grande en el terrario.

Cuidados

EL TERRARIO

Un adulto de *Python curtus* necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 45 cm (largo × ancho × alto). La especie es terrestre y rara vez trepa, así que la superficie del suelo importa más que la altura; los terrarios muy altos solo dificultan mantener la humedad. Las crías empiezan en una caja pequeña y cerrada, por ejemplo de 25 × 15 × 10 cm con orificios de ventilación, y se pasan a cajas mayores a medida que crecen. Los espacios demasiado grandes estresan a las crías y pueden hacer que dejen de comer.

El mejor material es PVC u otro plástico con pocas aberturas de ventilación bien colocadas, porque retiene mejor el calor y la humedad que el cristal. Si usas cristal, hay que tapar la mayor parte de la rejilla y rociar con más frecuencia. El terrario debe ser hermético y tener una tapa sólida con cierre, porque la serpiente es fuerte. Usa un sustrato de fibra de coco, virutas de coco o virutas de ciprés, de 7-10 cm de profundidad, mantenido húmedo pero no mojado. El papel de cocina o el papel kraft en varias capas es una solución práctica e higiénica, con la que regulas tú mismo la humedad. Evita el pino y el cedro.

Ofrece al menos dos escondites que se ajusten bien al cuerpo grueso, uno en cada extremo del gradiente, y cubre preferiblemente tres de los lados del terrario. La serpiente se mantiene sola. Cambia todo el sustrato cada 4-6 semanas y retira las heces enseguida.

TEMPERATURA

El terrario debe tener un gradiente suave: 26-28 °C durante el día, con un punto cálido de 30-31 °C en un extremo, y 25-26 °C por la noche. La especie tolera mal el calor: por encima de 32 °C se estresa, deja de comer y, en el peor de los casos, puede presentar síntomas neurológicos. Las oscilaciones deben ser pequeñas.

Lo mejor es dar el calor desde arriba con un emisor cerámico de calor o un panel radiante, siempre controlado por un termostato con la sonda a la altura de la serpiente. Se puede usar una manta térmica, pero la serpiente, pesada, se presiona contra el suelo y se quema con facilidad, así que debe colocarse bajo el escondite y estar controlada por termostato. No uses

nunca piedras calefactoras. Mide la temperatura con termómetros digitales en ambos extremos del terrario. Si la habitación está fría por la noche, hay que aportar calor sin luz.

Leer más: Calor y temperatura

HUMEDAD Y AGUA

La humedad es el parámetro ambiental más importante para *Python curtus*. La humedad del aire debe mantenerse estable en un 60-80 %. Por debajo del 60 % durante periodos prolongados provoca problemas de muda e infecciones respiratorias, y un terrario constantemente mojado provoca piel arrugada y podredumbre de las escamas. El objetivo es un aire húmedo, pero no estancado.

Mantén la humedad con un sustrato profundo y húmedo, aberturas de ventilación parcialmente tapadas y un recipiente de agua grande. Rocía el terrario según haga falta, sobre todo cuando la serpiente esté a punto de mudar, y comprueba que el sustrato se seca con facilidad entre pulverizaciones. El recipiente de agua debe ser tan grande que quepa toda la serpiente y de cerámica pesada, para que no vuelque. La especie bebe mucho y a menudo se queda en el agua, sobre todo antes de la muda y después de comer. Cambia el agua a diario y limpia el recipiente, porque la serpiente suele defecar en el agua. Si la serpiente pasa todo el tiempo en el agua, puede que el terrario esté demasiado caliente, que falte un escondite o que tenga ácaros. Un higrómetro en el terrario muestra si la humedad se mantiene.

Leer más: Enfermedades típicas y signos de enfermedad

ILUMINACIÓN Y UVB

Python curtus es más activa al atardecer y por la noche, pero necesita un ritmo fijo de día y noche. Doce horas de luz y doce de oscuridad, controladas con un temporizador, se adecuan al hogar ecuatorial de la especie. El terrario no debe estar muy iluminado, y la sombra y los escondites oscuros son más importantes que la luz.

La radiación UVB no es necesaria para esta especie nocturna y de vida escondida, y no hay documentados requisitos de UVB en cautividad. Se puede usar un tubo UVB débil como luz diurna, siempre que la serpiente pueda retirarse de la luz. La luz nocturna es innecesaria.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Python curtus come roedores enteros, congelados y descongelados. Las ratas son lo habitual, desde crías de rata para las crías hasta ratas medianas y grandes para los adultos. Se desaconseja la presa viva, porque el roedor puede herir a la serpiente. Descongela la presa en la nevera la noche anterior y caliéntala en una bolsa cerrada en agua caliente justo antes de la comida, porque la serpiente localiza la presa con las fosetas sensibles al calor de los labios, y una presa fría no despierta su interés. Ofrece la comida con unas pinzas largas y con movimientos tranquilos, porque la serpiente tiene un reflejo de alimentación muy fuerte.

El grosor de la presa debe corresponder a la parte más ancha de la serpiente. Las crías y los jóvenes en crecimiento se alimentan cada 7-10 días. A partir de unos tres años se alimenta cada 14 días con una rata de tamaño mediano a grande, y los animales que engordan con facilidad reciben presas más pequeñas o se alimentan cada 21 días, según el peso y la condición corporal. Son cifras orientativas. Una serpiente sana es firme y musculosa, con una sección ligeramente redondeada; si el cuerpo es blando y pastoso y la columna se pierde en la grasa, se está alimentando en exceso. La especie tiene mucho apetito y un metabolismo lento, así que la sobrealimentación y la obesidad son de los errores más frecuentes.

No manipules la serpiente durante al menos 72 horas después de una comida, porque la regurgitación supone una carga grave. Tras una regurgitación, espera al menos dos semanas y ofrece después una presa claramente más pequeña. Si la regurgitación se repite, hay que acudir al veterinario. Las heces pueden aparecer con varias semanas de intervalo, en adultos hasta cuatro meses, sin que sea un problema si la serpiente come y está sana. Pesa la serpiente con regularidad.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Python curtus es sedentaria y pasa la mayor parte del día escondida e inmóvil; es normal. Es pesada y fuerte y hay que sostenerla con ambas manos y antebrazos. Los animales acostumbrados al manejo son tranquilos, mientras que las crías pueden ser nerviosas y morder. La especie resopla y sisea con fuerza cuando se siente insegura, y eso es normal y no necesariamente un signo de agresividad.

Deja en paz a una serpiente recién adquirida hasta que coma con regularidad, antes de manipularla. Mantén las sesiones

cortas, tranquilas y regulares, y termínalas cuando la serpiente esté relajada. No la agarres nunca por la cabeza ni por la cola, y no la dejes colgando. No la manipules durante la muda ni en las 72 horas posteriores a una comida. Si te muerde, no tires para soltarla. Lava las heridas con agua y jabón. Una serpiente grande se maneja mejor cuando hay otro adulto presente.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

Las hembras adultas son más grandes y pesadas que los machos. El sexado con sonda en la cloaca debe hacerlo una persona con experiencia o un veterinario. La madurez sexual depende más del tamaño y de la condición corporal que de la edad. La edad no está documentada para la especie; la cifra de las especificaciones está tomada de *P. brongersmai*, en la que los animales alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años. Las hembras deben estar completamente desarrolladas y en buena condición corporal antes de aparearse.

APAREAMIENTO

No está documentado para la especie si hace falta un periodo de enfriamiento con una temperatura algo más baja para desencadenar el apareamiento. Los animales se mantienen por separado, y el macho se introduce con la hembra bajo vigilancia y se separa de nuevo después. Alimenta solo cuando los animales estén separados. La cría solo debe plantearse con mucha reflexión, y las crías deben tener buenos hogares.

PUESTA Y NIDADAS

La hembra pone pocos huevos, pero grandes, rara vez más de una docena. La cifra inferior de las especificaciones es una estimación. La hembra se enrolla alrededor de la puesta y puede temblar para producir calor si la temperatura baja. Ofrécele un escondite oscuro y húmedo para poner.

INCUBACIÓN

Los huevos se trasladan a una incubadora sin darles la vuelta. La temperatura de incubación no está documentada para la especie; 31-32 °C está tomada de parientes cercanos. Los huevos eclosionan al cabo de 2,5-3 meses (75-90 días).

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

Las crías recién nacidas miden 20-30 cm y son más claras que los adultos. Se mantienen por separado en cajas pequeñas y ventiladas con escondite y recipiente de agua a 26-28 °C y, tras la primera muda, se les ofrece una cría de rata pequeña una vez a la semana. Las crías son más sensibles que los adultos a los errores de humedad y temperatura, así que no elijas una cría recién nacida como primer ejemplar de la especie, sino una serpiente joven bien establecida, de unos meses, que coma bien.

Salud y errores frecuentes

Python curtus es resistente cuando el clima es el adecuado, pero los errores de humedad y temperatura provocan problemas rápidamente. Los fallos típicos son:

- Infección respiratoria con respiración sibilante, mucosidad y boca abierta. Suele deberse a humedad demasiado baja, mala ventilación o temperatura demasiado baja. Requiere veterinario si los síntomas duran más de un par de días.
- Podredumbre de las escamas, cuando el sustrato está constantemente mojado y el aire estancado. Mantén el sustrato húmedo, no mojado.
- Mala muda en aire demasiado seco. Aumenta la humedad cuando la serpiente esté a punto de mudar.
- Sobrepeso por una alimentación demasiado frecuente o abundante.
- Regurgitación, si la serpiente se manipula demasiado cerca de una comida o recibe una presa demasiado grande.
- Enfermedad de los cuerpos de inclusión (IBD), una enfermedad vírica de boas y pitones con síntomas neurológicos como la mirada al cielo y regurgitación crónica. No hay tratamiento, así que los animales nuevos deben pasar por cuarentena.

Las serpientes ocultan la enfermedad. El pesaje, las anotaciones sobre alimentación y muda y una revisión regular son la mejor alerta temprana. Consulta a un veterinario con experiencia en reptiles si la serpiente pierde peso, tiene problemas para respirar o no come durante varios meses.

Leer más: Cuarentena e higiene

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.