herpy

SERPIENTES

## Common Garter Snake

# *Thamnophis sirtalis*

*Thamnophis sirtalis* es una serpiente esbelta, diurna y curiosa, con rayas claras a lo largo del cuerpo. Vive junto al agua desde el sur de Canadá, a través de la mayor parte de Estados Unidos, hasta el norte de México. Es resistente, se mantiene activa y visible durante el día y puede alimentarse de ratones descongelados, pero es una maestra del escape y exige un terrario completamente hermético.

Familia: Colubridae

### DATOS CLAVE

#### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **50-100 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **6-10 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Terrestre y semiacuático** |
| Hábitat | **Humedal y bosque y prado templados** |
| Dificultad | **Principiante** |

#### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **100 × 50 × 50 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **23-27 °C** |
| Punto caliente | **29-32 °C** |
| Temperatura, noche | **18-22 °C** |
| Humedad | **35-60 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 2 |
| Reposo invernal | **8-15 °C**<br>8-16 semanas |
| Alimentación | **Vertebrados y lombrices/caracoles** |
| Se mantiene | **En solitario o en grupo** |

#### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Vivípara** |
| Madurez sexual | **18-24 meses** |
| Tamaño de la camada | **10-40 crías** |
| Puestas por año | **1** |
| Gestación | **60-90 días** |

#### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

**EL TERRARIO**

Un *Thamnophis sirtalis* adulto necesita un terrario de al menos 100 × 50 × 50 cm (largo × ancho × alto), y una hembra de más de 80 cm necesita uno de 120 × 60 × 60 cm.

**TEMPERATURA**

Debe haber un gradiente de temperatura claro. La zona de calor debe estar a 29-32 °C medidos en la superficie, el extremo frío a 23-27 °C y la noche a 18-22 °C. La fuente de calor se apaga por la noche.

**HUMEDAD Y AGUA**

La humedad ambiental debe situarse en el 35-60 %, más alta en el extremo frío y por la noche. El terrario no debe estar mojado, porque la humedad constante provoca ampollas en el vientre.

**ILUMINACIÓN Y UVB**

La especie es diurna y prospera con una luz intensa. El UVB no es estrictamente necesario, pero se recomienda y a menudo hace que la serpiente sea más activa.

**ALIMENTACIÓN**

*Thamnophis sirtalis* come presas distintas a las de la mayoría de las serpientes: lombrices de tierra, peces y roedores. No come insectos como grillos y gusanos de la harina.

**COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

*Thamnophis sirtalis* es rápida y curiosa, y suele volverse dócil si se manipula con regularidad desde joven.

**ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL**

Canadá, México y Estados Unidos.