herpy

TORTUGAS

## Tortuga sulcata

# *Centrochelys sulcata*

*Centrochelys sulcata* es la tortuga terrestre más grande del continente africano: el caparazón mide 50-85 cm, el peso llega hasta 90 kg y el animal puede vivir entre 50 y 80 años. Las crías son pequeñas, pero crecen rápido, y los adultos necesitan en invierno una estancia calefactada de más de 20 m², en verano un recinto exterior grande y un cuidador capaz de asumir esta responsabilidad durante décadas.

Familia: Testudinidae  Nombre en inglés: African Spurred Tortoise  Nombre anterior: *Geochelone sulcata; Testudo sulcata*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **50-85 cm**<br>longitud total con la cola |
| Peso | **30.000-90.000 g** |
| Esperanza de vida | **50-80 años** |
| Activo | **De día y al crepúsculo** |
| Modo de vida | **Terrestre y excavador** |
| Hábitat | **Semidesierto y sabana** |
| Dificultad | **Avanzado** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **640 × 320 × 120 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **24-32 °C** |
| Punto caliente | **38-41 °C** |
| Temperatura, noche | **21-23 °C** |
| Humedad | **40-80 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **Imprescindible**<br>Zona Ferguson 4 |
| Alimentación | **Plantas** |
| Se mantiene | **En solitario o en grupo** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Madurez sexual | **120-180 meses** |
| Tamaño de la puesta | **15-40 huevos** |
| Puestas por año | **2-3** |
| Incubación | **90-120 días**<br>a 30-31 °C |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **Apéndice II** |
| Anexo de la UE | **Anexo B** |
| UICN | **En peligro (EN)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Lo primero que hay que aclarar es el espacio. Una regla mínima muy extendida para tortugas terrestres es una longitud de 8 veces y una anchura de 4 veces la longitud del caparazón del ejemplar más grande. |
| **TEMPERATURA** | La temperatura del aire debe estar en 24-32 °C durante el día, con una zona de solario de 38-41 °C para los jóvenes, y 21-23 °C por la noche. |
| **HUMEDAD Y AGUA** | Aunque la especie procede de una zona seca, los jóvenes no deben mantenerse del todo en seco: en la naturaleza las crías eclosionan en la estación de lluvias y pasan mucho tiempo en madrigueras húmedas. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | Siempre debe haber un recipiente grande, bajo y estable con agua fresca, enterrado para que el animal pueda entrar y salir. El agua no debe llegar más arriba de las rodillas del animal. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | La especie es diurna y necesita luz intensa y UVB (zona 4 de Ferguson) durante todo el año en el interior, con un índice UV de unos 4-6 en el solario. |
| **ALIMENTACIÓN** | *C. sulcata* es herbívora y necesita una dieta rica en fibra y pobre en proteína. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | La especie es tranquila y lenta, pero no es una mascota para manipular. Al animal le estresa que lo levanten, y un adulto de 50-90 kg no puede ser levantado por una sola persona. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Etiopía, Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Níger, Mali, Mauritania, Senegal, República Centroafricana y Camerún. |