herpy

TORTUGAS

Tortuga patas rojas

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius es una tortuga terrestre mediana y oscura de las sabanas y los bordes de bosque de Sudamérica, con escamas rojas a naranjas en la cabeza y las patas. El caparazón suele alcanzar 30-35 cm, vive al menos 50 años y es una de las tortugas terrestres tropicales más mantenidas. Necesita humedad ambiental alta y calor todo el año, y come plantas, fruta y un poco de alimento animal.

Familia: Testudinidae Nombre en inglés: Red-Footed Tortoise Nombre anterior: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-45 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**50-70 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Sabana, bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**280 × 140 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**32-35 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2-7 huevos**
Incubación	**105-200 días** a 28-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Chelonoidis carbonarius* es una tortuga activa que aprovecha todo el espacio que se le da. Vive en el suelo, por lo que la superficie es más importante que la altura.
TEMPERATURA	En interior debe haber un gradiente. La temperatura del aire es de 24-29 °C durante el día, y la zona de calor bajo la lámpara es de 32-35 °C, medida sobre el propio sustrato.
HUMEDAD Y AGUA	La especie procede de un clima cálido y húmedo y necesita una humedad ambiental alta: 70-90 %, con picos breves cercanos al 100 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	*C. carbonarius* es de actividad diurna y necesita UVB cuando no está al sol directo. Mide un índice UV de 2,0-3,0 en la zona de calor (zona 2 de Ferguson).
ALIMENTACIÓN	*C. carbonarius* es omnívora y en la naturaleza come plantas, flores, fruta, hongos y un poco de alimento de origen animal.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es curiosa, activa y relativamente tranquila. Aprende a conocer a su cuidador, se acerca de buen grado cuando hay comida y toma el alimento de la mano o de unas pinzas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Trinidad y Tobago.