herpy

TORTUGAS

## Painted Turtle

# *Chrysemys picta*

*Chrysemys picta* es una tortuga de hábitos diurnos y semiacuática de Norteamérica, con rayas rojas y amarillas en el cuello, las patas y el borde del caparazón. El caparazón mide 13-25 cm y el animal puede vivir muchas décadas. Un adulto necesita un recipiente grande y con filtración, con varios cientos de litros de agua, una zona de baño de sol caliente y una potente luz UVB.

Familia: Emydidae

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **13-25 cm**<br>longitud total con la cola |
| Peso | **300-500 g** |
| Esperanza de vida | **25-40 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Semiacuático** |
| Hábitat | **Humedal y bosque y prado templados** |
| Dificultad | **Intermedio** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **130 × 65 × 60 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **20-30 °C** |
| Punto caliente | **30-40 °C** |
| Temperatura, noche | **15-24 °C** |
| Humedad | **50-80 %** |
| Agua | **Acuaterrario**<br>profundidad 25-35 cm |
| Temperatura del agua | **21-27 °C** |
| UVB | **Imprescindible**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentación | **Insectos, alimento completo, plantas, vertebrados y lombrices/caracoles** |
| Se mantiene | **En solitario o en grupo** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Tamaño de la puesta | **4-15 huevos** |
| Puestas por año | **1-5** |
| Incubación | **72-80 días**<br>a 25-30 °C |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **Anexo B** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Mantén al animal en un acuario, un contenedor grande o un estanque interior cerrado, no en un terrario convencional. |
| **TEMPERATURA** | La superficie de la zona de sol debe estar a unos 40 °C, medidos con un termómetro infrarrojo un par de horas después de encender las lámparas, y el aire sobre la zona de sol a 30-35 °C. |
| **HUMEDAD Y AGUA** | La humedad de la tortuga es el propio agua, así que la humedad relativa del aire no está documentada con más detalle para la especie y no es determinante; 50-80 % en la sala es más que suficiente. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | El agua es el lugar donde vive el animal, así que debe ser profunda, limpia y cálida. El agua debe tener como mínimo el doble de profundidad que la anchura del caparazón, y 25-35 cm es adecuado para adultos. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | El UVB es imprescindible. La especie pertenece a la zona 3-4 de Ferguson. |
| **ALIMENTACIÓN** | *C. picta* es omnívora. En la naturaleza come plantas acuáticas, algas, insectos acuáticos, crustáceos, caracoles, peces pequeños y carroña. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *C. picta* es diurna, tímida y rápida para huir al agua. No está domesticada y no disfruta del contacto, por lo que solo debe manipularse cuando sea necesario, por ejemplo en revisiones de salud o durante la limpieza. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Canadá, Estados Unidos y México. |