herpy

TORTUGAS

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana es una tortuga terrestre africana de tamaño mediano, con un caparazón alargado y una bisagra móvil en la parte posterior que permite cerrar el caparazón sobre las patas traseras y la cola. El caparazón mide 15-22 cm de longitud. La especie vive en sabana con una estación de lluvias y una estación seca bien marcadas, necesita calor estable y cierta humedad, y se estresa con facilidad. Los ejemplares recién importados suelen portar muchos parásitos.

Familia: Testudinidae Nombre anterior: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-22 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**30-50 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**160 × 80 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**28-32 °C**
Punto caliente	**32-35 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-6 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**105-200 días** a 28-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco con seguridad sobre el mantenimiento de *Kinixys belliana*, porque gran parte de los conocimientos antiguos proceden de la época en que varias especies se consideraban una sola.
TEMPERATURA	El animal debe mantenerse caliente. De día debe haber 28-32 °C, y la zona de calor es de 32-35 °C, medida sobre el sustrato.
HUMEDAD Y AGUA	Como especie de sabana, *K. belliana* necesita menos humedad que las especies de bosque *Kinixys homeana* y *Kinixys erosa*, pero le gusta la humedad y hay que pulverizarla con regularidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	*K. belliana* es diurna, pero se la ve sobre todo a primera y a última hora del día, cuando la luz es tenue.
ALIMENTACIÓN	*K. belliana* es omnívora, y las crías son casi exclusivamente carnívoras.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es tímida y se retrae dentro del caparazón o se entierra cuando se la molesta. Está más activa a primera hora de la mañana y a última hora del día.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Angola, Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Tanzania y Malaui.