herpy

TORTUGAS

Tortuga leopardo

Stigmochelys pardalis

Stigmochelys pardalis es una tortuga terrestre grande, tranquila y herbívora de las sabanas de África, con manchas negras y amarillas como las de un leopardo sobre un caparazón alto y abovedado. Suele alcanzar unos 40 cm y puede vivir entre 50 y 100 años. Por eso necesita un recinto exterior muy grande en verano, calor y UVB en interior el resto del año y una dieta rica en fibra a base de hierba y plantas silvestres.

Familia: Testudinidae Nombre en inglés: Leopard Tortoise Nombre anterior: *Geochelone pardalis; Testudo pardalis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-45 cm** longitud total con la cola
Peso	**13.000-20.000 g**
Esperanza de vida	**50-100 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**320 × 160 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-32 °C**
Punto caliente	**35-40 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**40-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-30 huevos**
Puestas por año	**1-7**
Incubación	**150-450 días** a 28-32 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Los adultos deben tener un recinto exterior cuando el tiempo lo permita, en un clima del norte de Europa normalmente solo en los meses más cálidos del verano (véase Temperatura).

TEMPERATURA
En interior debe haber 24-32 °C de día, 35-40 °C en la zona de sol y 20-24 °C por la noche. Las cifras de la zona de sol y de la noche están tomadas en parte de la especie emparentada *Centrochelys sulcata*. La especie no hiberna.

HUMEDAD Y AGUA
La humedad ambiental no está documentada para la especie; 40-70 % en el recinto es una estimación. La especie procede de sabanas y zonas semiáridas y no es una especie húmeda.

ILUMINACIÓN Y UVB
Es necesaria la luz UVB o la luz solar natural, porque de lo contrario el animal no forma vitamina D3 y no puede absorber ni utilizar el calcio. La zona 3 de Ferguson es una estimación.

ALIMENTACIÓN
S. pardalis es herbívora y necesita una dieta rica en fibra y en calcio. El pastoreo es la base: hierba y hierbas variadas, que puedes cultivar tú mismo en el recinto, por ejemplo alfalfa y gramíneas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
S. pardalis es diurna, tímida y tranquila. Esconde la cabeza y las patas cuando se la molesta, pero con el tiempo aprende a reconocer a su cuidador y se acerca para recibir comida.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Sudán del Sur, Etiopía, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Esuatini y Lesoto.