herpy

VARANOS

Golden speckled tree monitor

Varanus boehmei

Un varano arborícola esbelto y negro, con manchas doradas dispuestas en filas en forma de V, que solo vive en la isla de Waigeo, frente a Nueva Guinea. Es una especie rara en cautividad y poco conocida, por lo que los cuidados aquí descritos se basan en datos de parientes cercanos. Requiere un terrario grande, alto y húmedo, nebulización diaria y un cuidador con experiencia.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**70-90 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 100 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-30 °C**
Punto caliente	**38-45 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**60-90 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3 huevos**
Incubación	**157-161 días** a 29-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Varanus boehmei* es un trepador, por lo que la altura es más importante que la superficie del suelo.
TEMPERATURA	Los valores para *Varanus boehmei* se han tomado de *V. beccarii* y otras especies del grupo. De día, el aire debe estar a 26-30 °C, más fresco abajo y más cálido arriba, junto a la zona de calor. El animal debe poder elegir.
HUMEDAD Y AGUA	Las especies del grupo de *V. prasinus* se deshidratan con facilidad y son más difíciles de mantener que muchos otros varanos.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Varanus boehmei* es probablemente diurno y se asolea en lo alto de los árboles, por lo que la luz aporta tanto calor como UVB.
ALIMENTACIÓN	Los parientes del grupo se alimentan sobre todo de insectos y otros invertebrados, y probablemente lo mismo ocurre con *Varanus boehmei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Varanus boehmei* es pequeño y de constitución ligera, y un adulto de 70-90 cm tiene garras afiladas y puede morder, pero los daños no son comparables a los de los varanos grandes.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Indonesia.