herpy

VARANOS

Bogert's Monitor

Varanus bogerti

Varanus bogerti es un varano negro y arborícola de las islas situadas frente al extremo sudeste de Nueva Guinea, y pertenece al grupo de los varanos arborícolas en torno a *Varanus prasinus*. La especie solo se conoce por un puñado de ejemplares de museo y apenas se ha visto en cautividad, por lo que los cuidados se basan en sus parientes más cercanos.

Familia: Varanidae Nombre anterior: *Varanus prasinus bogerti*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**82-94 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 80 × 180 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-34 °C**
Punto caliente	**45-50 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**70-95 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2-3 huevos**
Incubación	**157-203 días** a 29-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Varanus bogerti*, y la especie apenas se ha visto en cautividad.
TEMPERATURA	Durante el día la temperatura debe ser de 24-34 °C y por la noche de 22-25 °C. La temperatura superficial en los puntos de asoleamiento debe ser de 45-50 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 70-95 %. Pulveriza el terrario varias veces al día con agua fresca, preferiblemente con un sistema automático, y deja que el sustrato se seque un poco entre pulverizaciones.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz UVB. Usa una lámpara combinada de calor y UVB sobre el punto de asoleamiento, de modo que el animal pueda elegir entre sombra y luz, y apunta a la zona 2 de Ferguson.
ALIMENTACIÓN	La alimentación se ha tomado de *V. beccarii* y *V. prasinus*, que comen sobre todo grandes artrópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es probablemente tímida y nerviosa como otros varanos arborícolas, y la manipulación estresa al animal.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Papúa Nueva Guinea.