herpy

VARANOS

Bluetail monitor

Varanus doreanus

Varanus doreanus es un varano grande y robusto de la selva tropical de Nueva Guinea y del extremo norte de Australia, con el cuerpo gris azulado y una cola azul claro con bandas negras. La experiencia en su mantenimiento y cría es muy escasa, y varias de las cifras proceden de parientes cercanos.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**100-135 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**300 × 150 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-33 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**24-26 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Zona de agua**
Temperatura del agua	**26-28 °C**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**4-9 huevos**
Incubación	**164-166 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Varanus doreanus* necesita un terrario grande con una poza de agua donde pueda nadar y bucear.
TEMPERATURA	Durante el día, el terrario de *Varanus doreanus* debe estar a 26-33 °C, con una zona de sol a 40-45 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La especie vive en selva tropical con unos 1.700 mm de lluvia al año en el cabo York y más en partes de Nueva Guinea. Mantén la humedad ambiental en un 60-80 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y usa zonas de sol, por lo que se recomienda UVB y encaja la zona 3 de Ferguson.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza *Varanus doreanus* se alimenta de reptiles, huevos (sobre todo de tortuga) e insectos como escarabajos, y probablemente también de polluelos. En el terrario encajan insectos grandes, ratones, pescado y cangrejos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos son fuertes y rápidos y pueden causar heridas graves. La mordedura de un varano de un metro o más puede ser profunda, las garras son afiladas y pueden desgarrar la piel, y la cola se usa como látigo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/varanos/varanus-doreanus