herpy

VARANOS

Kimberley Rock Monitor

Varanus glauerti

Un varano de roca esbelto y de patas largas procedente de Kimberley, en el noroeste de Australia, con la cabeza oscura, ocelos gris azulados en el dorso y una cola con nítidas bandas negras y blancas. *Varanus glauerti* alcanza solo 60-80 cm, pero es exigente: necesita un terrario grande, cálido y alto, con superficies rocosas y grietas, y su cuidador debe tener experiencia con UVB, incubación de huevos y animales asustadizos.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**60-80 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y rupícola**
Hábitat	**Sabana y terreno rocoso**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 80 × 100 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-32 °C**
Punto caliente	**45-55 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**50-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3-9 huevos**
Puestas por año	**1-4**
Incubación	**104-110 días** a 28,5-29,5 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario de al menos 150 × 80 × 100 cm (largo × ancho × alto). Una pareja debería tener 190 × 100 × 105 cm. Cuanto más grande, mejor, porque el animal trepa, corre y necesita un gradiente de temperatura claro.

TEMPERATURA

Varanus glauerti se calienta mucho al sol y necesita zonas de insolación cálidas. La temperatura superficial de la zona de insolación, medida con termómetro de infrarrojos, debe ser de 45-55 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe ser del 50-80 %, preferiblemente del 60-80 % para animales en cría. A los adultos se les pulveriza un par de veces por semana. A las crías se les pulveriza a diario, porque son más activas con humedad alta.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y requiere una luz UVB intensa (zona 3 de Ferguson).

ALIMENTACIÓN

La especie se alimenta sobre todo de insectos. Los adultos se alimentan 3-4 veces por semana con grillos, cucarachas dubia, saltamontes y gusanos de seda, y de vez en cuando con un ratón subadulto o una cría de rata recién nacida.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es asustadiza y debe acostumbrarse a la manipulación poco a poco. Las primeras semanas tras llegar a casa, el animal debe estar tranquilo.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.