herpy

VARANOS

Pygmy Rock Monitor

Varanus kingorum

Uno de los varanos más pequeños del mundo: un habitante de las rocas del norte de Australia, de color pardo rojizo y moteado oscuro, que mide 18-40 cm incluida la cola. Se alimenta de insectos, es diurno y atrevido en el terrario, y necesita muchos refugios estrechos, mucho calor y un sustrato profundo y ligeramente húmedo donde poder excavar.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-40 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola y terrestre**
Hábitat	**Sabana y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**45-50 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**40-60 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**6-10 meses**
Tamaño de la puesta	**2-4 huevos**
Incubación	**89-126 días** a 27-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Una pareja adulta necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 45 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. Las medidas son bajas y alargadas porque la especie vive en el suelo y entre piedras.

TEMPERATURA

La especie necesita mucho calor. Bajo una zona de solario, la temperatura superficial debe ser de 45-50 °C, medida con un termómetro de infrarrojos directamente sobre la piedra o la corteza, no en el aire. Es solo una zona pequeña.

HUMEDAD Y AGUA

El aire del terrario puede ser relativamente seco, en torno al 40-60 %, pero el sustrato debe mantenerse uniformemente húmedo.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y prospera mejor con luz intensa y UVB. Usa una combinación de una bombilla de calor y un tubo UVB, por ejemplo un tubo T5 de 10-12 % sobre la parte cálida del terrario.

ALIMENTACIÓN

Varanus kingorum se alimenta exclusivamente de insectos. Los insectos rápidos, como los grillos y las cucarachas rojas corredoras, son claramente preferibles a las lentas cucarachas dubia y a los gusanos de la harina.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

V. kingorum es atrevido y activo en el terrario y se desplaza al aire libre durante el día cuando tiene refugios de sobra. Es rápido y puede saltar a la mano cuando ve comida.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.