herpy

VARANOS

Biak Emerald Monitor

Varanus kordensis

Varanus kordensis es un varano arborícola, esbelto y de color verde, con una red de manchas anulares oscuras, y vive únicamente en la isla de Biak, al norte de Nueva Guinea. Pertenece a un grupo de varanos arborícolas conocidos por ser difíciles de mantener y de reproducir, y apenas existen datos de manejo detallados para esta especie en concreto.

Familia: Varanidae Nombre anterior: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**70-90 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 80 × 180 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-34 °C**
Punto caliente	**45-50 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**75-95 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Tamaño de la puesta	**2-5 huevos**
Puestas por año	**1-3**
Incubación	**160-190 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

El manejo de *Varanus kordensis* es casi idéntico al de los demás varanos arborícolas verdes: un terrario grande y alto con muchos escondites, ramas gruesas y tubos de corcho.

TEMPERATURA

Las temperaturas están tomadas de *Varanus beccarii* y son un punto de partida prudente para *Varanus kordensis*. De día la temperatura debe ser de 24-34 °C y de noche de 22-25 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe ser alta, de aproximadamente un 75-95 %, y no debería bajar del 75 %. Las condiciones secas provocan deshidratación y problemas con la muda.

ILUMINACIÓN Y UVB

Varanus kordensis es diurna y toma el sol en las copas de los árboles. No se conoce la necesidad de UVB de la especie, pero se recomienda proporcionarlo.

ALIMENTACIÓN

Varanus kordensis se alimenta sobre todo de insectos. En cautividad la dieta base consiste en grillos, cucarachas, saltamontes y huevos, y el pollo, la carne, las gambas y los roedores se dan solo de vez en cuando.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Varanus kordensis es tan pequeña que una mordedura rara vez es grave, pero las garras son afiladas y pueden causar heridas profundas, y la cola se usa para agarrarse, no para azotar.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Indonesia.