herpy

VARANOS

Blue Tree Monitor

Varanus macraei

Varanus macraei es un varano arborícola esbelto, con cola prensil y un patrón de manchas azules en forma de ojo sobre fondo negro. Vive únicamente en la isla de Batanta, en Indonesia, está amenazado en la naturaleza y requiere un terrario alto, cálido y húmedo, insectos vivos y un cuidador con experiencia.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**80-110 cm** longitud total con la cola
Peso	**150-530 g**
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 80 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**29-32 °C**
Punto caliente	**38-40 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-26 meses**
Tamaño de la puesta	**2-7 huevos**
Puestas por año	**1-4**
Incubación	**150-240 días** a 28,5-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Varanus macraei* es un varano arborícola, y por eso el terrario debe ser, ante todo, alto. Para un ejemplar adulto, la medida mínima es de 120 × 80 × 150 cm (largo × ancho × alto), y más es mejor.
TEMPERATURA	La temperatura diurna en el terrario se mantiene entre 29 y 32 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental se mantiene en el 70-90 % con pulverización diaria, preferiblemente por la mañana y por la tarde.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita una luz intensa y UVB durante todo el día.
ALIMENTACIÓN	*Varanus macraei* come insectos vivos: saltamontes, grillos, cucarachas (p. ej. *Blaptica dubia*), gusanos de la harina y supergusanos, y de vez en cuando lombrices de tierra.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna, tímida y nerviosa. Los ejemplares nuevos se esconden o huyen al ser tocados y pueden chocar contra los cristales. Las hembras son más asustadizas que los machos. No se debe forzar al animal a ser manipulado.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Indonesia.