herpy

VARANOS

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus es un varano amarillo de tamaño medio originario de las islas Sula, en Indonesia. Los adultos son de un amarillo intenso, y las crías son negras con manchas amarillas. La especie requiere un terrario grande con estanque y zonas de calor muy cálidas para tomar el sol, se alimenta de insectos y vertebrados y está amenazada en la naturaleza, por lo que solo es adecuada para un cuidador con experiencia.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**90-130 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**300 × 120 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-33 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**24-26 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 80 cm
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2-12 huevos**
Incubación	**164-171 días** a 28-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un único ejemplar adulto necesita al menos 300 × 120 × 150 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. Una pareja necesita al menos 400 × 120 × 150 cm, divisible en dos mitades iguales para poder separar a los animales.

TEMPERATURA

La temperatura ambiente del terrario es de 26-33 °C durante el día, y la zona de sol bajo las lámparas de calor debe alcanzar 40-45 °C medidos como temperatura superficial con un termómetro de infrarrojos.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe ser alta, de alrededor del 60-80 %, como en las especies emparentadas del grupo que incluye a *V. indicus*. Pulveriza a las crías a diario con agua de lluvia; el estanque también contribuye a la humedad.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y toma mucho el sol. Proporciona UVB con tubos fluorescentes o lámparas de calor con UVB, para que el animal pueda elegir su dosis (zona 3 de Ferguson).

ALIMENTACIÓN

La especie es carnívora.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los adultos de este tamaño tienen dientes y garras que pueden causar heridas profundas, y la cola está comprimida y puede usarse para azotar.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Indonesia.