herpy

VARANOS

Mitchell's water monitor

Varanus mitchelli

Varanus mitchelli es un varano esbelto y semiacuático del norte de Australia, que suele medir 60-70 cm y como máximo alrededor de 1 m de longitud, con una cola natatoria comprimida lateralmente. La especie es tímida, casi desconocida en el terrarismo y está catalogada como en peligro crítico, porque el veneno del sapo introducido *Rhinella marina* ha diezmado sus poblaciones. Existen muy pocas experiencias de mantenimiento y es una especie reservada a criadores muy experimentados.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**60-96 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y semiacuático**
Hábitat	**Sabana y humedal**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**200 × 100 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**28-32 °C**
Punto caliente	**40-50 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**50-80 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 20-30 cm
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**7-27 huevos**
Puestas por año	**2-6**
Incubación	**90-289 días** a 26-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**En peligro crítico (CR)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Casi no hay experiencia en el mantenimiento de *Varanus mitchelli*, por lo que las pautas se basan en la especie emparentada *V. acanthurus*, en una única cría de la especie y en su vida en la naturaleza.
TEMPERATURA	De día, el terrario debe estar a 28-32 °C y la zona de insolación debe alcanzar 40-50 °C medidos como temperatura superficial con un termómetro de infrarrojos. De noche se apaga el calor y la temperatura baja a 22-25 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe situarse en 50-80 %: algo más alta por la noche y junto al agua, más seca en la zona de insolación. La zona de agua y un sustrato húmedo mantienen la humedad.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie es semiacuática, por lo que una zona de agua fija forma parte del terrario y no es solo un bebedero.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol, y necesita UVB equivalente a la zona 3 de Ferguson.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, la especie come sobre todo saltamontes, arañas y peces, pero también otros invertebrados, anfibios, reptiles y sus huevos, pequeños mamíferos y aves.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Varanus mitchelli* es una especie tímida y cauta que se esconde mucho y no es un animal que se coja a diario.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia.