herpy

VARANOS

## Yellow tree monitor

# *Varanus reisingeri*

Un varano arborícola esbelto, amarillo y negro, procedente de la isla de Misool, en Indonesia, con una larga cola prensil y brillantes manchas amarillas en el dorso. Es una especie poco frecuente en terrarios, exige un terrario alto y cálido con mucha humedad y es apropiada para el aficionado experimentado a los varanos, no para el principiante.

Familia: Varanidae

### DATOS CLAVE

#### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **80-95 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **10-15 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Selva tropical** |
| Dificultad | **Avanzado** |

#### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **120 × 60 × 180 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **27-32 °C** |
| Punto caliente | **35-48 °C** |
| Temperatura, noche | **24 °C** |
| Humedad | **60-90 %** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 2 |
| Alimentación | **Insectos y vertebrados** |
| Se mantiene | **En solitario o en pareja** |

#### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Tamaño de la puesta | **1-7 huevos** |
| Incubación | **160-170 días**<br>a 29 °C |

#### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **Apéndice II** |
| Anexo de la UE | **Anexo B** |
| UICN | **Datos insuficientes (DD)** |

## Cuidados de un vistazo

**EL TERRARIO**

Un adulto necesita un terrario alto, fabricado a medida, de al menos 120 × 60 × 180 cm (largo × ancho × alto), y la altura es más importante que la superficie del suelo.

**TEMPERATURA**

La temperatura diurna en el terrario debe ser de 27-32 °C, y por la noche no debe bajar de unos 24 °C. Sobre una zona de solario a la que el animal pueda acercarse del todo, la temperatura de la superficie debe ser de 35-48 °C.

**HUMEDAD Y AGUA**

La humedad del aire debe ser alta, de alrededor del 60-90 %, y preferiblemente por encima del 70 %. Mantenla pulverizando el terrario con fuerza a mano por la mañana y dejando que el aire se seque un poco a lo largo de la tarde.

**ILUMINACIÓN Y UVB**

*Varanus reisingeri* es diurno y necesita 12 horas de luz al día con tubos fluorescentes o LED.

**ALIMENTACIÓN**

*Varanus reisingeri* es un cazador versátil que se alimenta de insectos y otros invertebrados, así como de vertebrados pequeños.

**COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

Los animales capturados en la naturaleza son tímidos, se esconden y se estresan con facilidad. Puede tardar varios meses hasta que un animal salvaje confíe en ti.

**ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL**

Indonesia.