herpy

VARANOS

Solomon Island spiny monitor

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus es un varano raro y casi desconocido de las islas Salomón y Bougainville, reconocible por su textura de escamas espinosas, parecida al papel de lija, y por las filas de grandes manchas amarillas sobre un fondo oscuro. Los cuidados se basan en especies emparentadas, porque apenas hay experiencia con esta especie en cautividad.

Familia: Varanidae Nombre anterior: *Varanus indicus spinulosus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**90-100 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**300 × 120 × 200 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-30 °C**
Punto caliente	**40-48 °C**
Temperatura, noche	**24-25 °C**
Humedad	**60-90 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 10-40 cm
Temperatura del agua	**26-29 °C**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**4-7 huevos**
Incubación	**150-195 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Las medidas se han tomado de varanos emparentados de unos 100-140 cm de longitud.
TEMPERATURA	Las temperaturas para *Varanus spinulosus* se han tomado de *V. juxtindicus* y de otras especies del grupo *V. indicus*. La temperatura del aire se mantiene en 27-30 °C de día y 24-25 °C de noche, y la del agua en 26-29 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe ser del 60-80 % de día y mayor de noche, hasta cerca del 90 %. Se consigue con una zona de agua grande, sustrato húmedo y pulverización diaria.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Los parientes del grupo *V. indicus* nadan y bucean con frecuencia y duermen en el agua, así que se recomienda una zona de agua fija, aunque la especie no sea conocida como semiacuática.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol a pleno sol a mediodía, así que de adulta necesita luz intensa y UVB.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza la especie come artrópodos, huevos de gallinas domésticas, pescado y pequeñas aves. Sale del bosque para coger las vísceras del pescado limpiado, saquea gallineros y busca alimento en la zona intermareal.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	En la naturaleza la especie es esquiva y huye hacia las copas de las palmeras. Un animal capturado puede bufar y, aun así, calmarse rápido sin intentar morder, pero no se sabe más sobre su temperamento.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.