herpy

VARANOS

Tricoloured monitor lizard

Varanus yuwonoi

Varanus yuwonoi es un varano raro y de colores llamativos de los bosques de Halmahera, en Indonesia, con la parte delantera del cuerpo negra, la trasera finamente moteada de verde, azul y negro, y la cola azul. Casi todos los ejemplares que se comercializan son capturados en la naturaleza, y su mantenimiento y reproducción son prácticamente desconocidos. Es una especie para cuidadores muy experimentados que dispongan de espacio para una habitación entera.

Familia: Varanidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**100-150 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**300 × 150 × 180 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-30 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**23-25 °C**
Humedad	**70-90 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**4-9 huevos**
Incubación	**164-166 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Las cifras de mantenimiento y reproducción de *Varanus yuwonoi* se han tomado de la especie muy emparentada *Varanus melinus*, del mismo grupo, o son estimaciones.

TEMPERATURA

En la naturaleza hay 25-30 °C todo el año en las tierras bajas. En el terrario debe haber un gran gradiente de temperatura.

HUMEDAD Y AGUA

La especie vive en un clima húmedo de bosque sin época seca. Mantén la humedad ambiental en 70-90 % con pulverización diaria y un sustrato húmedo, sobre todo en la parte inferior, donde el animal excava.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y toma el sol, por lo que necesita una luz intensa y UVB. Usa tubos o bombillas UVB junto con una o varias lámparas de punto de calor, para que el animal pueda elegir entre sol y sombra.

ALIMENTACIÓN

La alimentación en la naturaleza no se ha estudiado, pero la especie probablemente toma aves, lagartos, serpientes e invertebrados junto a los montículos de nidificación y excava en busca de huevos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es agresiva cuando se la manipula.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Indonesia.