herpy

AGAMES

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster est une agame forestière gris-vert à brune, dotée d'une épine derrière chaque œil et d'une crête basse de piquants sur la nuque. Elle est répandue du sud de la Chine au Vietnam, au Laos, puis à la Thaïlande et au Myanmar. L'espèce atteint 20-28 cm, vit dans les broussailles et sur le sol forestier, et exige un terrarium humide et relativement frais, où l'air ne dépasse pas 28 °C.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-28 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**100 × 50 × 100 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**20-26 °C**
Zone de bain de soleil	**28-30 °C**
Température, nuit	**18-21 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Partie aquatique**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**6-12 œufs**
Incubation	**110-130 jours** à 25-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 100 × 50 × 100 cm (longueur × largeur × hauteur). L'espèce utilise aussi bien les branches que le sol, si bien que la surface au sol compte autant que la hauteur.

TEMPÉRATURE

Acanthosaura lepidogaster supporte mal la chaleur. L'air du terrarium doit se situer entre 20 et 26 °C le jour et ne doit pas dépasser 28 °C.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'humidité doit se situer entre 70 et 80 % le jour et, de préférence, autour de 90 % la nuit. Vaporisez abondamment le terrarium avec de l'eau douce 2-3 fois par jour, de façon que des gouttes perlent sur les plantes et les parois.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est diurne, mais vit à l'ombre en forêt et n'a besoin que d'un UVB faible.

ALIMENTATION

L'espèce se nourrit d'insectes et d'autres petits animaux. Proposez une alimentation variée de grillons, blattes, criquets, vers à soie, vers de terre et petites limaces.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Acanthosaura lepidogaster est une agame forestière calme, qui reste souvent parfaitement immobile sur une branche, un tronc ou le sol. Elle se déplace rarement vite.

AIRE D'ORIGINE

Chine, Laos, Myanmar (Birmanie), Thaïlande et Viêt Nam.