herpy

AGAMES

Lézard à collerette

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii est un grand agame arboricole originaire du nord de l'Australie et du sud de la Nouvelle-Guinée. Il est connu pour la grande collerette de peau qu'il porte autour du cou et qu'il déploie en position de défense menaçante. Il atteint 60 à 90 cm, est diurne et se nourrit d'insectes. En revanche, il exige un terrarium très haut, une chaleur intense et des UVB, et il est farouche et facilement stressé.

Famille: Agamidae Nom anglais: Frilled Lizard Ancien nom: *Clamydosaurus kingii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**60-90 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**400-870 g**
Espérance de vie	**8-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Savane et forêt sèche**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**150 × 75 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**27-32 °C**
Zone de bain de soleil	**38-42 °C**
Température, nuit	**23-27 °C**
Hygrométrie	**60-70 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la ponte	**4-20 œufs**
Pontes par an	**2-4**
Incubation	**70-110 jours** à 28-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un animal adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 150 × 75 × 150 cm (longueur × largeur × hauteur).
TEMPÉRATURE	Le poste d'insolation doit se trouver en haut du terrarium, avec une température de surface de 38 à 42 °C, autour de 40 °C comme point de départ.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer entre 60 et 70 %, et le terrarium doit être vaporisé. L'espèce vit dans un climat à fortes pluies en été et boit les gouttes d'eau.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et aime se chauffer au soleil ; elle a donc besoin d'un éclairage puissant sur tout le terrarium et d'un poste d'insolation avec lumière chauffante et UVB.
ALIMENTATION	*Chlamydosaurus kingii* est insectivore. L'alimentation se compose de grillons, de blattes, de chenilles, de vers à soie et de quelques ténébrions géants.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*C. kingii* est calme et peu mobile dans le terrarium, mais farouche face aux mouvements dans la pièce.
AIRE D'ORIGINE	Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Indonésie.