herpy

AGAMES

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata est un petit uromastyx trapu des déserts rocheux situés autour de la partie sud de la mer Rouge. Le dos est orné de taches claires en forme d'œil, et le mâle est plus coloré que la femelle. L'espèce atteint 25-30 cm, se nourrit de végétaux et creuse un terrier dans un substrat profond et sec. Elle exige un terrarium chaud et sec, avec de forts UVB, et se confond facilement avec ses plus proches parents.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**25-30 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-25 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Rupicole, terrestre et fouisseur**
Habitat	**Désert, semi-désert et terrain rocheux**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**27-32 °C**
Zone de bain de soleil	**50-55 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**20-30 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Plantes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**36-60 mois**
Taille de la ponte	**4-20 œufs**
Incubation	**60-70 jours** à 33-34 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 120 × 60 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux.
TEMPÉRATURE	La zone d'insolation doit présenter une température de surface de 50-55 °C, mesurée avec un thermomètre infrarouge juste sous la lampe. Le côté frais se situe à 27-32 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être faible, environ 20-30 %, mesurée au niveau du substrat du côté frais. Une humidité élevée et persistante rend l'animal malade ; ne vaporisez donc pas le terrarium.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'un éclairage puissant. Utilisez une lampe LED ou un tube fluorescent d'environ 6500 K comme lumière du jour, séparée de la source de chaleur ; les animaux sont plus actifs et mangent mieux ainsi.
ALIMENTATION	*Uromastyx ocellata* est herbivore. Environ 90 % de l'alimentation doit être constituée de feuilles vertes et de fleurs, environ 5 % de légumes durs et environ 5 % d'aliments secs.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les adultes sont calmes et sédentaires, mais territoriaux envers leurs congénères, surtout les mâles envers les autres mâles. Gardez-les individuellement.
AIRE D'ORIGINE	Égypte, Soudan, Érythrée, Djibouti, Éthiopie et Somalie.