herpy

CAMÉLÉONS

Brown Leaf Chameleon

Brookesia superciliaris

Brookesia superciliaris est l'un des plus grands caméléons nains des feuilles et atteint 9-10 cm au total. Il vit dans la litière des forêts humides de l'est de Madagascar, est brun comme une feuille morte et porte de grosses protubérances osseuses au-dessus des yeux. Il se maintient dans un petit terrarium humide, avec une épaisse litière de feuilles et de petites proies. Réputé difficile, il est aujourd'hui reproduit régulièrement en petit nombre.

Famille: Chamaeleonidae Ancien nom: *Chamaeleo superciliaris*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**9-10 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**2-4 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 30 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**20-25 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**70-95 %**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**4-5 mois**
Taille de la ponte	**2-5 œufs**
Pontes par an	**2-3**
Incubation	**45-120 jours** à 18-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances rassemblées sur l'entretien de *Brookesia superciliaris*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 20-25 °C et la température nocturne de 16-20 °C, comme dans la forêt humide des hautes terres. La baisse nocturne se produit d'elle-même à l'extinction des lampes.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit se situer entre 70 et 95 %, avec un maximum juste après la brumisation et la nuit. Brumisez abondamment le terrarium au moins deux fois par jour avec de l'eau tiède.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et vit à l'ombre.
ALIMENTATION	L'espèce mange de petits insectes : drosophiles, collemboles, petits grillons, vers de farine à petite taille (ténébrions) et petites blattes. Les proies ne doivent pas dépasser environ 20 % de la longueur du corps de l'animal.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce se maintient seule. Elle est farouche, mais vive, et se stresse facilement en cas de dérangement et de contact ; il ne faut donc pas la prendre en main. En cas de danger, elle peut vibrer.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.