herpy

CAMÉLÉONS

## Carpet Chameleon

# *Furcifer lateralis*

*Furcifer lateralis* est un petit caméléon coloré des forêts, fourrés et jardins de Madagascar. La femelle est particulièrement vivement marquée, surtout lorsqu'elle est gravide. L'espèce ne mesure que 17-25 cm, atteint la maturité en quelques mois et ne vit que 2-3 ans ; sa taille modeste en fait un caméléon abordable pour le soigneur expérimenté.

Famille: Chamaeleonidae  Ancien nom: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **17-25 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Espérance de vie | **2-3 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Arboricole** |
| Habitat | **Savane et forêt tropicale humide** |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **24-29 °C** |
| Zone de bain de soleil | **32-35 °C** |
| Température, nuit | **18-22 °C** |
| Hygrométrie | **60-100 %** |
| UVB | **Indispensables**<br>Zone de Ferguson 3 |
| Alimentation | **Insectes** |
| Détention | **Seul** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Maturité sexuelle | **3-6 mois** |
| Taille de la ponte | **6-23 œufs** |
| Pontes par an | **3-6** |
| Incubation | **150-400 jours**<br>à 20-25 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| Annexe UE | **Annexe B** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur). |
| **TEMPÉRATURE** | La température diurne doit être de 24-29 °C. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | L'humidité de l'air doit être de 60-100 %. Le terrarium peut sécher dans la journée, tant que l'air est relativement humide et que l'animal peut boire chaque jour. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | L'espèce est diurne et aime le soleil ; elle exige donc une lumière puissante et des UVB. Utilisez un tube T5 HO de 6500 K pour la lumière et un tube UVB donnant la zone de Ferguson 3 sur la zone d'ensoleillement. |
| **ALIMENTATION** | *F. lateralis* est strictement insectivore. La proie doit avoir environ la longueur de la distance entre les yeux ; les vers de farine peuvent être plus longs. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | L'espèce est gardée seule. Les mâles sont agressifs et territoriaux, et les femelles se stressent facilement. Les animaux peuvent se mordre ; l'accouplement doit donc être surveillé, et les animaux séparés quand il est terminé. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Madagascar. |