herpy

CAMÉLÉONS

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor est un petit caméléon des hautes terres centrales de Madagascar. Le mâle est beige et brun, avec deux cornes nasales, tandis que c'est la femelle qui est colorée, surtout lorsqu'elle est gravide. L'espèce atteint 16-23 cm au total, elle est menacée à l'état sauvage et rare en captivité. Elle exige un éleveur expérimenté en matière de caméléons, notamment parce que les femelles ont facilement des problèmes de ponte.

Famille: Chamaeleonidae Ancien nom: *Chamaeleo minor*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-23 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**2-4 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Savane, forêt sèche et forêt de montagne**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-26 °C**
Zone de bain de soleil	**32-38 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**60-100 %**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**5-9 mois**
Taille de la ponte	**4-18 œufs**
Pontes par an	**1-3**
Incubation	**190-270 jours** à 22-24 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte doit disposer d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur).
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 21-26 °C. Prévoyez un point chaud de 32-38 °C, mesuré en température de surface avec un thermomètre infrarouge, et laissez le bas du terrarium plus frais.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer entre 60 et 100 %. L'espèce vient d'une région à forte hygrométrie, mais le terrarium doit sécher au cours de la journée afin d'éviter l'eau stagnante et les maladies.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et héliophile et exige un éclairage puissant. Utilisez un tube T5 de 6500 K pour la lumière et un tube UVB donnant la zone 3 de Ferguson au point chaud ; cette zone est empruntée à *Furcifer pardalis*.
ALIMENTATION	*F. minor* est strictement insectivore. Proposez une alimentation variée : grillons, blattes, vers de farine géants (ténébrions) et drosophiles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce se garde seule, et on ne réunit deux animaux que pour l'accouplement. Les animaux sont agressifs envers leurs congénères, y compris les jeunes, et peuvent se blesser gravement.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.