herpy

CAMÉLÉONS

Caméléon de Jackson

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii est un caméléon de taille moyenne des forêts de montagne du Kenya et de Tanzanie. Le mâle porte trois cornes dirigées vers l'avant, et la femelle met bas des petits vivants au lieu de pondre. L'espèce exige des nuits fraîches, une forte humidité nocturne et des soins minutieux : elle convient surtout au soigneur expérimenté.

Famille: Chamaeleonidae Nom anglais: Jackson's Chameleon Ancien nom: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-38 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-9 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt de montagne**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 60 × 120 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**20-24 °C**
Zone de bain de soleil	**27-30 °C**
Température, nuit	**10-15 °C**
Hygrométrie	**40-100 %**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Vivipare**
Maturité sexuelle	**5-12 mois**
Taille de la portée	**8-30 petits**
Gestation	**150-180 jours**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 60 × 120 cm (longueur × largeur × hauteur). La hauteur est plus importante que la surface au sol, car l'espèce utilise toute la hauteur.
TEMPÉRATURE	L'espèce vient des hautes terres et supporte mal la chaleur. La température diurne dans le terrarium doit être de 20-24 °C. Sur la zone d'ensoleillement sous la lampe, il doit faire 27-30 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit suivre le rythme journalier de l'espèce : environ 90-100 % la nuit et 40-50 % le jour. Un taux constant de 60-80 % n'est pas correct et peut rendre l'animal malade.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et demande beaucoup de lumière. Un tube T5 HO de 6500 K ou une puissante lampe LED sur toute la largeur du terrarium fournit l'éclairage.
ALIMENTATION	*T. jacksonii* est insectivore. La proie ne doit pas être plus grande que la distance entre les yeux. Variez l'alimentation : criquets, grillons, nymphes de blattes, mouches et petits coléoptères.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est gardée seule toute sa vie. Les mâles sont territoriaux et ne devraient jamais pouvoir se voir. Deux animaux ne sont réunis que lorsqu'une femelle est amenée à un mâle pour l'accouplement.
AIRE D'ORIGINE	Kenya et Tanzanie.