herpy

CAMÉLÉONS

Cameroon Two-horned Mountain Chameleon

Trioceros montium

Trioceros montium est un caméléon vert de taille moyenne, originaire des montagnes du Cameroun. Le mâle porte deux longues cornes sur le museau, une haute crête dorsale et une voile sur la queue, tandis que la femelle est dépourvue de cornes. L'espèce est ovipare et exige une hygrométrie très élevée ainsi qu'une installation calme et densément plantée. Elle est rare en terrariophilie et convient surtout au éleveur expérimenté.

Famille: Chamaeleonidae Ancien nom: *Chamaeleo montium; Chamaeleo monticum*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-25 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**4-6 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 60 × 90 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**22-25 °C**
Zone de bain de soleil	**29-32 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**6 mois**
Taille de la ponte	**5-25 œufs**
Pontes par an	**2-3**
Incubation	**140-160 jours** à 22-25 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Quasi menacée (NT)**

À propos de l'espèce

Trioceros montium est un caméléon arboricole de taille moyenne. Le mâle atteint jusqu'à 25 cm au total, queue comprise, et la femelle environ 20 cm. Le mâle porte deux longues cornes dirigées droit vers l'avant depuis le museau, une haute crête dorsale ondulée et une voile caudale plus haute encore. La femelle n'a que de petites écailles coniques à la place des cornes et pas de voile caudale.

La couleur de base va du vert forêt vif au vert sombre ou bleuâtre. De grandes écailles en plaques sur le corps peuvent être orange, vert clair ou bleu ciel, et le mâle présente souvent une bande jaune bordée de bleu, oblique du dos vers le ventre. En parade, le mâle montre des taches bleues, vert citron et jaunes sur la tête et les épaules. Une femelle gravide fonce et laisse souvent apparaître une peau rouge entre les écailles vertes. Les couleurs varient selon l'humeur, la température et le stress, et non selon l'environnement.

Le nom scientifique signifie « des montagnes » et renvoie à l'aire de répartition dans les montagnes du Cameroun. L'espèce est moins courante en terrariophilie que les grandes espèces de *Trioceros*, et les données d'élevage sont rares. Les dimensions du terrarium, la zone UVB et les quantités de nourriture sont donc empruntées à des espèces de montagne proches.

En savoir plus: Lumière et UVB

Répartition et habitat

Trioceros montium est endémique du Cameroun et se rencontre le long de la partie sud de la chaîne volcanique, du mont Cameroun aux monts Manengouba. L'espèce a aussi été trouvée dans le district de Mamfe, sur le mont Kupe et dans les Rumpi Hills. Elle vit entre 600 et 1 250 m d'altitude, donc sur les pentes basses et moyennes des montagnes plutôt qu'au sommet.

> **Aire d'origine:** Cameroun.

HABITAT

L'espèce vit en forêt humide sur les pentes montagneuses, dans les vallées de cours d'eau et en forêt de nuages à basse et moyenne altitude, où les précipitations sont abondantes et où nuages et brume s'accrochent souvent aux arbres.

L'hygrométrie est élevée en permanence et les nuits sont plus fraîches que les jours. Les animaux se tiennent dans la végétation dense et sont craintifs.

En savoir plus: Hygrométrie, brumisation et ventilation

Entretien

LE TERRARIUM

Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 60 × 90 cm (longueur × largeur × hauteur). L'espèce se garde seule, et les mâles ne doivent pas pouvoir se voir.

Aménagez le terrarium de façon très dense, avec des plantes vivantes, des branches fines et des brindilles à plusieurs hauteurs, et veillez à un bon éclairage pour les plantes. Les animaux doivent pouvoir se retirer complètement dans le feuillage. Un terrarium hybride en verre et grillage assure la ventilation tout en conservant l'humidité, et une évacuation au fond élimine l'excès d'eau. Un substrat n'est pas nécessaire.

L'air stagnant provoque des infections respiratoires : l'air doit donc circuler, même quand l'humidité est élevée.

TEMPÉRATURE

La température diurne doit être d'environ 22-25 °C, avec un point chaud de 29-32 °C. Un terrarium plus frais avec un petit point chaud convient mieux qu'un terrarium chaud.

La nuit, la température doit descendre à 15-20 °C, mais d'au plus 10 °C environ sous la température diurne.

Contrôlez la température avec deux thermomètres, un à chaque extrémité du terrarium.

En savoir plus: Chaleur et température

HYGROMÉTRIE ET EAU

Une hygrométrie très élevée est essentielle pour l'espèce. L'humidité doit atteindre près de 100 % et l'animal doit avoir accès à l'eau en permanence, y compris pendant la journée. Brumisez le terrarium avec un brumisateur à ultrasons la nuit et tôt le matin, et pulvérisez ou faites goutter le matin et en fin d'après-midi, afin que l'animal ait régulièrement des gouttes à boire.

L'espèce boit les gouttes d'eau sur les feuilles, pas dans une coupelle. Utilisez de l'eau distillée dans le brumisateur et placez deux hygromètres, un à chaque extrémité du terrarium. Les branches et les feuilles doivent pouvoir sécher de temps en temps, afin d'éviter moisissures et plaies.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est diurne. Offrez 12 à 13 heures de lumière par jour et un puissant tube T5 HO ou une LED sur toute la largeur du terrarium. Les plantes du terrarium demandent aussi beaucoup de lumière.

Les UVB sont recommandés toute l'année. Utilisez la zone 2 de Ferguson, c'est-à-dire un indice UV de 1-3 au plus sur le point chaud et beaucoup d'ombre. Un UV-mètre est utile. Remplacez le tube UVB selon les indications du fabricant.

ALIMENTATION

T. montium est insectivore et bon chasseur, et prend la plupart des insectes d'élevage. Donnez des grillons, de petites sauterelles, des mouches, des nymphes de blattes et d'autres petits insectes, la proie ne devant pas dépasser la distance entre les yeux de l'animal. Laissez les insectes se déplacer librement afin que l'animal les chasse ; la gamelle est déconseillée.

Les insectes doivent eux-mêmes recevoir une nourriture riche et être saupoudrés de calcium. Les vitamines se donnent avec parcimonie, car les mâles surtout sont sensibles au surdosage. Les jeunes sont nourris chaque jour, et les adultes reçoivent 3 à 8 insectes tous les deux jours. Gardez l'animal mince et pesez-le chaque mois.

En savoir plus: Proies : élevage et reproduction En savoir plus: Calcium, vitamines et compléments

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

L'espèce se garde seule. Les animaux sont souvent agressifs envers leurs congénères, et la femelle doit être tenue à l'écart du mâle jusqu'à ce qu'elle soit réceptive.

L'espèce est craintive. Si l'on s'approche trop vite ou de trop près, l'animal se laisse souvent tomber et file, noircit, fait des culbutes ou se cache dans les coins près du sol. C'est un animal d'exposition, pas un animal de compagnie, et les manipulations doivent être brèves et rares. Des couleurs sombres peuvent indiquer le froid, le stress ou la maladie.

Les animaux capturés dans la nature doivent être traités contre les parasites. Avec le bon traitement et les bonnes conditions, l'espèce peut devenir un caméléon de terrarium robuste.

En savoir plus: Achat d'animaux : élevage, capture dans la nature et transport

Reproduction

MATURITÉ SEXUELLE ET SEXAGE

Le mâle se reconnaît aux deux cornes sur le museau, à la haute crête dorsale, à la voile caudale et aux couleurs vives, tandis que la femelle n'a ni cornes ni voile. La femelle est plus petite. La maturité sexuelle survient vers 6 mois.

ACCOUPLEMENT

La reproduction peut être difficile, car les mâles sont souvent réticents. Gardez la femelle séparée du mâle, hors de sa vue également, et ne l'amenez dans le terrarium du mâle que lorsqu'elle est réceptive. Une période un peu plus fraîche avec une humidité plus élevée peut stimuler le mâle. Séparez les animaux une fois l'accouplement terminé ou si la femelle repousse le mâle.

PONTE ET COUVÉES

L'espèce est ovipare. La femelle fonce lorsqu'elle porte des œufs et les pond 2 à 3 mois après l'accouplement. Une ponte compte 5 à 25 œufs, et il peut y avoir 2 à 3 pontes par an.

La femelle n'est pas difficile quant au lieu de ponte et pond n'importe où : elle doit donc disposer dans le terrarium d'un bac de ponte adapté avec de la terre humide, faute de quoi les œufs sont facilement perdus.

INCUBATION

Les œufs sont incubés à 22-25 °C, de préférence autour de 24 °C avec une légère baisse la nuit. Maintenez une température stable et évitez les températures d'incubation très basses comme très élevées, car une température intermédiaire est le choix le plus sûr. Les œufs éclosent après environ 21 semaines.

En savoir plus: Incubation des œufs

ÉLEVAGE DES JEUNES

Les jeunes éclosent souvent en même temps et ont un bon appétit. Gardez-les dans un terrarium hybride avec le même climat que les adultes, avec beaucoup de feuillage et de branches fines. Nourrissez-les chaque jour de petits insectes comme des drosophiles, de petites mouches et de petits grillons, saupoudrés de calcium. Les jeunes sont séparés les uns des autres en grandissant, et les mâles ne doivent pas pouvoir se voir.

Santé et erreurs courantes

Problèmes typiques et erreurs d'entretien :

- Déshydratation due à une hygrométrie trop faible et à trop peu de possibilités de boire.
- Parasites intestinaux chez les animaux capturés dans la nature.
- Infections respiratoires dues à un air stagnant ou à des surfaces trop humides.
- Maladie métabolique des os (MBD) due à un manque d'UVB ou de calcium.
- Surdosage de vitamines, surtout chez les mâles.
- Plaies et moisissures dues à des branches constamment humides.
- Œufs perdus ou retenus si la femelle n'a pas de lieu de ponte adapté.

La longévité n'est pas documentée ; 4 à 6 ans est une estimation. Pesez l'animal chaque mois. Consultez un vétérinaire expérimenté en reptiles en cas d'arrêt de l'alimentation, de couleur sombre, de flaccidité ou de difficultés respiratoires.

En savoir plus: Maladies courantes et signes de maladie

Demandez toujours conseil à quelqu’un qui s’y connaît

Ce guide est un bon point de départ, mais il ne remplace pas l’expérience. Les animaux diffèrent, et une grande partie de l’essentiel s’apprend auprès de personnes qui élèvent l’espèce depuis des années. Parlez à un éleveur, à un terrariophile expérimenté ou à un vétérinaire qui connaît les reptiles et les amphibiens avant d’acquérir l’animal - et de nouveau si quelque chose vous semble anormal.