herpy

CÉCILIES

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana est une petite cécilie sans pattes, que l'on ne trouve que dans les monts Taita, dans le sud-est du Kenya. La femelle pond quelques œufs dans une chambre creusée dans le sol et reste auprès d'eux, et les jeunes tout juste éclos se nourrissent de sa couche superficielle de peau. L'espèce est menacée et son entretien en captivité est presque inconnu.

Famille: Herpelidae Ancien nom: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**24-30 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Fouisseur**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-24 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**90-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Développement direct (pas de larves)**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**24 mois**
Œufs par saison	**5**
Soins parentaux	**Garde les œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Boulengerula taitana*. Le climat des monts Taita est tropical mais doux en raison de l'altitude, avec deux saisons des pluies, et l'espèce vit dans une terre meuble et humide.
TEMPÉRATURE	La température du sol n'a pas été mesurée pour l'espèce. 21-24 °C le jour et 19-22 °C la nuit sont une estimation, adaptée aux cécilies terrestres et à un climat de montagne doux.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	Le substrat doit être uniformément humide, et l'air dans la boîte est presque saturé, 90-100 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a besoin ni de gamelle d'eau ni de partie aquatique. La condensation sur les parois de la boîte suffit pour boire, et l'eau sert uniquement à maintenir le substrat humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sous terre et n'a besoin ni d'UVB ni d'aucun autre éclairage. Le rythme jour-nuit ordinaire de la pièce, avec 10-14 heures de lumière, suffit.
ALIMENTATION	Dans la nature, *Boulengerula taitana* mange surtout des termites et des vers de terre ; les jeunes prennent surtout des vers de terre. En captivité, les petits vers de terre constituent l'aliment de base le plus réaliste.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Boulengerula taitana* vit cachée sous terre, et un animal en bonne santé reste enterré la plupart du temps. L'espèce est maintenue individuellement afin de suivre facilement le poids et la santé.
AIRE D'ORIGINE	Kenya.