herpy

CÉCILIES

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma est une cécilie robuste et fouisseuse des forêts pluviales, des plantations et des jardins d'Afrique centrale, pouvant atteindre environ 46 cm de long. Elle pond ses œufs dans le sol, et la femelle reste enroulée autour des œufs et des jeunes, qui se nourrissent de sa couche cutanée externe. L'espèce s'est montrée résistante en captivité par rapport à d'autres cécilies.

Famille: Herpelidae Ancien nom: *Caecilia squalostoma*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**24-46 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Fouisseur**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**22-25 °C**
Température, nuit	**21-23 °C**
Hygrométrie	**90-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Développement direct (pas de larves)**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par saison	**16**
Soins parentaux	**Garde les œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*H. squalostoma* se garde en petit nombre, et les soins reposent sur l'espèce elle-même et sur d'autres cécilies terrestres. L'animal est terrestre et fouisseur : tout tourne donc autour du sol.
TEMPÉRATURE	L'espèce se garde à une température stable et douce : 22-25 °C le jour et 21-23 °C la nuit. La température moyenne du sol influe sur la quantité que les animaux mangent ; elle doit donc rester constante.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'air du bac est presque saturé, 90-100 %, car le sol est humide. L'humidité se maintient en pulvérisant le substrat et en retournant de temps à autre les premiers centimètres.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a besoin ni de bac à eau ni de partie aquatique. L'humidité vient du sol, et la condensation sur les parois du bac suffit pour boire. Un bac à eau peut rendre le sol trop humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sous terre, et un programme d'éclairage particulier n'est pas nécessaire. Le rythme jour-nuit normal de la pièce, avec 10 à 14 heures de lumière, suffit.
ALIMENTATION	Les vers de terre constituent une base d'alimentation éprouvée : les jeunes peuvent devenir de grands adultes robustes avec des vers de terre seuls, lorsque ceux-ci sont enrichis en calcium et en vitamines.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*H. squalostoma* passe presque toute sa vie sous terre et se voit rarement en surface.
AIRE D'ORIGINE	Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et République centrafricaine.